

Prevention and Control of poultry
Diseases

**Kanatlı hayvan hastalıklarını önleme ve
Kontrol**

Dr. Research Assistant Bülent BAŞ

Principles of biosecurity

Biyogüvenlik prensipleri

- 1- Young and old chickens should not be kept together.
- 1- Yetiřtirmede genç ve yařlı tavuklar bir arada bulundurulmamalıdır.

- 
- 2- Contact with diseased houses should be stopped.
 - 2- Hastalıklı kümesler ile temas kesilmelidir.

- 3-Patient and suspected animals should be disposed of properly.
- 3- Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar uygun şekilde imha edilmelidir.

- 4- Poultry and farm inlets and outlets should be controlled.
- 4- K mes ve iftlik giriř ıkıřları kontrol altına alınmalıdır.

- 5- Foreigners should not be allowed into the fowl.
- 5- Kümese yabancıların girmesi yasaklanmalıdır.

- 6-When entering the house, the boot of that fowl should be worn and disinfected with disinfectant.
- 6- Kümese girerken o kümese ait çizme giyilmeli ve dezenfektan madde ile dezenfekte edilmelidir.

- 7- Wild birds and other livestock must be prevented from entering the poultry house.
- 7- Kümese yabancı kuşların ve diğer çiftlik hayvanlarının girmesi engellenmelidir.

- 8- Ventilation, heat, light, humidity, feeder, drinker, nest and number of animals per square meter should be checked in the poultry houses..
- 8- K meslerde havalandırma, ısı, ışık, rutubet, yemlik, suluk, folluk ve metrekareye d şen hayvan sayısının yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- 
- 9- Blood tests should be carried out at regular intervals.
 - 9- Belirli aralıklarla kan testleri yapılarak portörler ayıklanmalıdır.

- 10- Blood tests should be performed 3-4 days before vaccination and 14-21 days after vaccination and antibody levels should be determined.
- 10- Aşı yapılmadan 3-4 gün önce ve aşı yapıldıktan 14-21 gün sonra kan testleri yapılmalı ve antikor düzeyleri belirlenmelidir.

- 
- 11-Disinfection of poultry house and poultry house materials should be done at the end of production.
 - 11- üretim sonunda kümes ve kümes malzemelerinin dezenfeksiyonu yapılmalıdır.