

Bovine Spogiform Encephalopathies

Dr. Research Assistant Bülent BAŞ

- When BSE disease is detected in cattle depending on the laboratory report, the animal health police commission meets and announces the outbreak of the disease.

a) On a farm, when BSE or BSE suspicious animals are detected, they are culled and burned.

- Laboratuvar raporuna bađlı olarak sığırlarda BSE hastalığı tespit edildiğinde hayvan sađlık zabıtası komisyonu toplanarak hastalık ıkış kararı alır ve ilan eder.

a) Bir işletmede, BSE'li ve BSE'den şüpheli hayvanlar tespit edildiğinde itlaf edilir ve yakılarak gömülür.

An expression of "May Be Contaminated with BSE" is recorded in the pedigree records of animals that have been diagnosed with BSE and animals that consume common feed in the past, and these animals are monitored throughout their lifetime in terms of the BSE table.

- b) BSE tanısı konan hayvanlarla geçmişte ortak yem tüketen hayvanların pedigrî kayıtlarına "BSE Bulaşmış Olabilir" şeklinde bir ifade işlenir ve BSE tablosu açısından bu hayvanlar yaşamları boyunca izlenir.

- c) The Ministry shall determine the principles of fight against the disease and inform the governors.

- c) Bakanlık hastalıkla ilgili gerek gördüğü her türlü mücadele esaslarını tespit ederek valiliklere bildirir.

Equine infectious anemia

- When the infectious anemia of the horses is detected due to the laboratory report, the animal health police commission meets and announces the outbreak of the disease. Blood serum taken from the suspected horses according to the a) procedure is sent to the laboratory.
- Laboratuvar raporuna bađlı olarak atların enfeksiyöz anemisi hastalıđı tespit edildiđinde hayvan sađlık zabıtası komisyonu toplanarak hastalık ıkıř kararı alır ve ilan eder.
 - a) Hastalıktan řüpheli atlardan usulüne uygun olarak alınan kan serumu ilgili laboratuvara gönderilir.

- b) Animals that are detected as infected or suspected of infection are culled and buried in deep pits with lime or burning. Animals considered to be suspicious of infection are housed in protected areas against fly invasion at least 200 meters from healthy animals.

- b) Enfekte veya hastalıktan şüpheli olarak tespit edilen hayvanlar itlaf edilir ve derin çukurlara üzerlerine kireç dökülerek veya yakılarak gömülür. Bulaşmadan şüpheli olarak kabul edilen hayvanlar, sağlıklı hayvanlardan en az 200 metre mesafe uzaklıkta sinek invazyonuna karşı korunmalı mekanlarda barındırılır.

- c) Since the infection is transmitted by insect flies, flies are applied against flies.

- Enfeksiyon, sokucu sinekler tarafından nakledilmesi sebebiyle sineklere karşı ilaçlamalar yapılır.

- d) The patient is discharged after disinfecting the feeders, floor and walls and tools, goods and materials in the place where the animals are suspected of disease and contamination.

- Hasta, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanların buldukları yerdeki yemlikler, zemin ve duvarlar ile alet, eşya ve malzemeler dezenfekte edildikten sonra kullanılır.

- e) The Ministry shall determine the principles of fight against the disease and inform the governors.

- Bakanlık hastalıkla ilgili gerek gördüğü her türlü mücadele esaslarını tespit ederek valiliklere bildirir.