

Kuraklık Fizyolojisi

JEOLUJİ VE JEOMORFOLOJİ

ANAKAYA JEOLJİSİ

- Çok önemlidir, hem morfolojiyi hem de erozyona dayanıklılıđı etkiler.
- öl ortamı anakayaç jeolojisi ile yeryüzünde cereyan eden olayların uzun süreli ilişkisi sonucudur ve aynı bölgede farklı koşullara yol açar.

- Erozyona bađıl dayanıklılık oranlarını hem fiziksel ve kimyasal özellikleri hem de topoğrafya ile belirlediđi gibi erozyonla dođan yapıların tanecik Őekil ve boyutlarını, çözünürlük ve taşınabilirliklerini de belirler.

- Genelde dayanıklı anakayaç kayaları yüksek rakımlarda çölleşmeye neden olur ve kaya yapılarının geometrisi ve dizilişi de çöllerin coğrafi şekillerini belirler.

- Yeryüzünü etkileyen jeolojik olaylar iç ve dış olarak gruplandırılabilir. İç olaylar kırılma ve bükülme gibi etkilerle topoğrafyayı oluştururken rüzgar etkisine açık olma, su drenaj yolları gibi özellikleri de ortaya çıkarır.

- Dayanıklılığın aynı olduđu ortamlarda da iklim kořullarının etki řekli ve derecesi hem yeryüzüdeki etkisi hem de önleyici vejetasyonu sınırlayıcı etkisiyle önem kazanır.
- Jeolojik etki yapabilecek düzeyde yağış olmadığında rüzgar önem kazanır. Yağış hem fiziksel hem de kimyasal etkiler yaratırken rüzgarın etkisi tümüyle fizikseldir. Hava nemi ise kimyasal etki yaratır.

öl röllyefi

- Geçişler serttir, bağımsız su birikintileri görülebilir. Çukurdaki birikimler yamaçlar ve sınırlarını belirginleştirir, taban düzlemsele yakındır. Bazen zincirleme vadiler, tepe ve çukur silsileleri de görülür.

SUYUN ETKİLERİ

- Orta kurak bölgelerdeki çorak alanlarda suyun etkileri sürekli olduğundan ağırlığı fazladır ve topoğrafik izler bırakır.
- Özellikle kalker gibi çözünen kayaçları çok etkiler, yüzeydeki çentikli, oyuntulu görünümle kendini belli eder.

YERALTI SUYUNUN ETKİLERİ

- Fiziksel etkileri poröz kayalardan gevşek yapıları çekerek uzaklaştırmak suretiyle zayıflatmak ve zamanla seçii olarak bozunuma neden olmaktır. Özellikle ince taneli sedimanlarda kendini gösterir.
- Kimyasal etki çözünür tuzları çekerek çöktürmesidir. Kalkerli tüf veya traverten oluşumuna neden olur. sıcak dönemlerde de yüzeyde bu tuzların birikimi görülür.

KURAK veya YARIKURAK BÖLGE ÖZELLİKLERİ

Nemli bölge ile semiarid - yarıkurak bölgenin sınırı

- Nemli bölge ile semiarid - yarıkurak bölgenin sınırını yağış ile evaporasyon potansiyeli dengesi çizer.
- Doğal olarak bu da havanın Bağıl nemi ve dolayısı ile sıcaklığına bağlıdır. Karasal çöllerde kışın günlerin kısalığı soğuk etkisini arttırır ve hava hareketleri havanın sürekli kuru kalmasına neden olur.
- Yazın ise güneş enerjisi alçak basınca neden olur ve çevreden içe hava akımı yaratır. Çevre dağlık ise nem aşağıda kaldığından dağları aşamaz ve iç kısma kuru hava akımı olur.

- Yaz yağışları düzensiz ve yereldir, çünkü dağları geçebilen nem yeryüzü örtüsünün heterojenitesi ve rakım farklılıkları nedeniyle konveksiyona uğrar.
- Kısa süreli ve yerel fırtınalar olur, özellikle sırtlar, vadiler hava akımı yarattığından bu fırtınaları destekler.
- Yıllık yağış çanakta 12 cm olurken dağların rüzgarlı eteklerinde 100 cm olabilir.

- Sukkulens ile kurađa dayanıklılık kış ı sert yrelerde -1...- 4 °C nin altında mineral beslenmesi ve osmotik basınca bađlı olarak direnci kırdıđından karasal steplerde pek geerli olamaz.

- Kış gecelerinde sıcaklıkları hava drenajı kontrol eder.
- Güneşin batışı ile toprak yüzeyi ve hemen üstündeki hava tabakası çabuk soğur.
- Soğuma ile hava yoğunluğu ve ağırlığı artar ve sırtlardan aşağıya esinti ile süzülür, çukurlarda soğuk birikirken yamaçlarda doğan boşluğu daha sıcak hava doldurur.
- Kuvvetli bir hava akımı ve sıcaklık değişimi modeli doğar

- Dođal olarak anak - tepe rakım farkları ile eđimler, kuzey ve gúneye bakıř önemli rol oynar.
- Kıř yađıřın bol olduđu zaman olduđundan gúneye bakan yamalardaki daha sıcak kořullar nemin kamasına neden olur, kuzey yamalarda ise nem tutulur.
- Sonuçta vejetasyon- bitki örtüsü farklılıkları yüksek olur.

- Vejetasyon tipleri yerel topoğrafya ve edafik koşullara göre, örn. Volkanik, granitik anakaya cinsine göre farklılaşabilmektedir.
- Gün ortasındaki ortalamalar ise çanakta 15 derece iken tepelerde 4 derece gibi beklenen farklılıkları gösterir.
- Yazın ise koşul farklılıkları azalır, gecelerin kısalığı hava drenajı etkisini azaltır ve gece sıcaklıkları kritik değerlerden uzaktır.

- Semiarid, orta kurak bölgelerdeki çorak alanlarda toprağın üst yüzeyinin kabuklaşması suyun yüzeyden akışına neden olarak topoğrafik izler bırakır.
- Özellikle kalker gibi çözünür kayaçları çok etkiler, yüzeydeki çentikli görünümle kendini belli eder.

- Fiziksel etkileri poröz kayaçlardan gevşek yapıları çekerek uzaklaştırmak suretiyle zayıflatmak ve zamanla seçici olarak bozunuma neden olmaktır.
- Özellikle ince taneli sedimanter kayaçlarda kendini gösterir. Kimyasal etki çözünür tuzları çekerek çöktürmesidir. Kalkerli tüf veya traverten oluşumuna neden olur. Sıcak dönemlerde de yüzeyde bu tuzların birikimi görülür.

Çölleşme vejetasyon çeşitliliğini azaltır,

- Toprak tekstürü, eğim, kumluluk gibi ekstrem koşullara adapte olabilen cinslerin türlerine indirgenir.
- Drenajı yetersiz alkali düzlüklerde vejetasyon zayıftır ve örneğin çeşitli *Atriplex*, *Astragalus*, *Salvia*, *Thymus* türleri gibi türler görülür.
- Halofitler de yanlarında bulunur. Sert zemin üzerindeki ağır topraklarda en iyi gelişimlerini gösteren çalı türleri özellikle *Atriplex spp.* dir.
- Odunlulardan *Acacia*, *Juniperus*, *Eucalyptus* türleri olabilmektedir. Mimosoidae ağaçlarından *Acacia* türleri örneğin Güney Afrika, Arizona çöllerinde dahi yaşayabilmektedir.

Atriplex spp.

Çölleşme endemik tür artışına neden olur

- Perenniyal/ annual oranı 3/2 gibi yüksek oranlara ulaşır. Genelde çöl türleri sürekli evrimleşme ile ortaya çıkmış ve evrimlerini sürdüren türlerdir.
- Özel edafik ve fizyolojik koşullarda yaşayan, sadece kuru koşullara bağlı olmayan türlerdir. Örn. tuzlu, alkalin, kumul gibi ortamlar için seçicidirler, *Atriplex* bunlardandır alkalin, tuzlu topraklarda susuz ortam yanında toprağın yüksek osmotik basıncına dayanıklı oluşları ile yüksek rekabet gücü elde ederler.
- Bazı türler çölleşme koşullarındaki mikrohabitat koşullarına alttürleri sayesinde uyum sağlamışlardır. İklim koşulları soğuk ve nemli kış koşulları ile de rekabet tablosunu etkiler.

- Diđer bir faktör de vejetasyon sıklığı ile kendini gösteren rekabettir, yağış rejimine göre vejetasyon seyrelerek toplam terleme sabit tutmaktadır. Birçok sukkulent türün ekstraktlarının antibiyotik aktivitesi görölmüştür.

Yer altı Suyu

- Kurak alanlarda yeraltı suyunun derinliđi bitki örtüsü üzerinde etkilidir, örneđin çöllerde tabansuyu 100m. kadar derinde olabilir ve yüzeye eriřtiđinde de çok tuzlu olabilir.
- Yeraltı sularının hareketliliđi ısı, yüzey gerilimi, elektriksel alan, basınç, yerçekimi ve su kimyası gibi birçok etmenin bileřkesi olup, taban suyu üzerinde, su ile havanın beraber bulunduđu derinliklerde yüzey gerilimi ile kılcallık yer çekimini yendiđinde su yüzeye çıkar.
- Çöllerde toprak nemi sıcaklık deđiřiminin etkisi ile hareket eder. Yađıřtan sonra ısınan yüzey tabakası nemi yukarı çeker ve yüzey altında depolanmasına neden olur. özellikle kil ve siltlerde kimyasal osmoz etkili olur.

- Çok heterojen bir dađılım gösteren toprađın kapilaritesi önemli rol oynar.
- Kapilariteye bađlı olarak taban suyu evapotranspirasyon etkisi ile daha kısa veya uzun sürede yeryüzüne ulaşır.
- Tipik olarak düzlükleri çevreleyen yamaç ve dađlardan düzlüđe süzülen ve yer altında toplanan su bu yoldan evapotranspirasyonla atmosfere geçer.
- Büyük düzlüklerde veya 20-40mm.lik yağışlarda ise yeryüzüne yakın kısımdan yukarı çıkararak kısa sürede evapotranspirasyona uğrar.

- Karbonatlı veya volkanik kayalar üzerindeki bölgelerde bu kayaçların yüksek permeabilitesi nedeniyle taban suyu hareketliliği yüksek olabilir ve yağışlı mevsimlerde vejetasyon hareketlenir.
- Kökleri yüzeye yakın, yatay dağılan, yüzeyde kalan suyu kullanan kserofitler ile taban suyundan yararlanan freatofitleri birbirinden ayırmak gerekir.

- Fretofitler tabansuyuna doymuř olan taban derinliđi, evapotranspirasyonla kaybedilen oranı ve suyun kalitesi hakkında fikir verirler.
- Genellikle otsu freatofitler tabansuyu derinliđinin 3m.yi, alımsı olanlar ise 10m.yi ařmadıđı ortamlarda geliřirler. Ađalar iin bu derinlik 30m.yi bulabilir. Su derinliđi yanında tuzluluđu, bitki tr, toprak ve anakaya zellikleri de nemli rol oynar.

- Bazı türler su kalitesi indikatörüdür, örneğin tuzlusu yabancı otu (pickleweed -*Allenrolfea occidentalis*) taban suyunun tuza doymuş olduğu yerlerde yaşar.

- Kavak ve söğüt içilir kalitede tabansuyu indikatörüdür, hurma su seçmez, vs. Fretofitlerin su tüketimi iklim, tür ve bireyin sağlık durumu, bitki yoğunluğu ve su derinliği ile kalitesine bağlı olarak değişir.
- Örneğin kavak kurak ve sıcak ortamda yılda 2000-3000mm su tüketirse iyi büyüyebilir.

- Genelde akasya, kavak, söğüt gibi hızlı büyüyen ağaçların ve fretofitlerin su tüketimi yüksektir, 1 ha. alanda yoğun yetiştirme için yılda 2000m³ su gibi bir tüketim gerekir. Optimum koşullarda nemli topraktan evaporasyon doğrudan su yüzeyinden olana eşittir ve sıcak çöllerde yılda 250-320cm civarındadır. Ancak suyun tuzluluğu ile bu hız azalır.

- Genelde kurak alanlarda ve özellikle öllerde taban suları daha tuzludur, çünkü evapotranspirasyon/yağıř oranı yüksektir, yağıřlar řiddetli olduđundan yukarıda toplanan tuzu tabana indirir.
- Freatrofik ve otsu bahar vejetasyonun tahribi, permeabilitenin iyi olmadığı topraklarda sulama ile tuzlanma, sanayileřme veya sulama ile tabansuyunun kurutulması insan eliyle erozyon ve ölleřmeye neden olur.

Arid Zon Hidrojeolojisi:

- öllerde tabansuyu 100m. kadar derinde olabilir ve yüzeye eriştiğinde de çok tuzlu olabilir.
- Optimum koşullarda nemli topraktan evaporasyon doğrudan su yüzeyinden olana eşittir ve sıcak çöllerde yılda 250-320cm civarındadır. Ancak suyun tuzluluğu ile bu hız azalır. Derinlerden gelen suyun evaporasyonla kaybı kapilarite tüm profilde maks. düzeyde olamadığından genelde düşüktür, Fakat gene de taban suyu derinliğinin 5 m veya daha az olduğu geniş alanlarda önemli bir yer tutar.

Su Kalitesi

- Bekleneceđi üzere öl taban suları ok farklılıklar göstermekte ise de genelde daha tuzludur, ünkü evapotr./yađış oranı yüksektir, yađışlar şiddetli olduğundan yukarıda toplanan tuzu tabana indirir ve sonraki kurak ve sıcak dönemlerde tuz buharlaşan suda özünerek suyla yeryüzüne taşınır. Legümlerin ođu tuzla ok duyarlıdır. Buna karşılık bazı akasya türleri deniz suyu ile sulanabilir dirençtedir. Bazı söđüt türleri de aynı özelliktedir.
- Genellikle yeraltı sularında Na, Ca, Mg, HCO, Cl, SO₄, H₄SiO₄ ve daha az oranlarda da K, CO₃, Fe²⁺ ve F bulunur. Redükleyici koşullar ve düşük pH'ta Fe⁺⁺ dominant olabilir. Genel derişimler arttığında Mg(OH)₂, CaSO₄ ve MgCO₃ önem kazanır.

İnsan ve Hayvanların Etkileri

- Freatrofik ve otsu bahar vejetasyonun tahribi, permeabilitenin iyi olmadığı topraklarda sulama ile tuzlanma, sanayileşme ile tabansuyunun kurutulması sık görülen erozyon ve çölleşme etkenleridir.
-

- öl kuşlarının özellikle engebili alanlarda biriken sulardan yararlanarak ve üreme mevsimlerini nekadar seyrek ve düzensiz de olsa yağışlara denk getirerek soylarını sürdürebilen hayvan türleri tozlaşma için önemlidir, restorasyonda tüm bu olanakların değerlendirilmesi gerekmektedir.