



İpekböceği Yetiştirme


Prof. Dr. H. Vasfi Gençer

A. Ü. Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
Ankara

Ekipman ve Çevre

- Böcek bakım yerlerinin hazırlanması
- Araç-gereçlerin sağlanması
- Sıcaklık ve nem koşullarının sağlanması

Yetiştirme Evleri



Dezenfeksiyon

- Formalin (%2) solüsyonu: yetiştirme odasına inficardan 3-10 gün önce uygulanmalıdır. Oda sıcaklığı en az 5 saat 24 °C'nin üzerinde olmalıdır. Sprey uygulamasından 15 saat sonra oda havalandırılmalıdır.
- Sönmüş kireç tozu: her deri deęiştirme (uyku) döneminde 1 kez (toplam 4 kez) böcekler üzerine uygulanır. 1 kutu ipekböceęi için 15 kg sönmüş kireç tozu gerekir.

Ekipman

- Kerevetler
- Besleme tablaları
- Parafinli kağıt
- Yaprak kıyma tahtaları
- Yaprak kıyma bıçakları
- Yaprak muhafaza sandıkları
- Temizlik ağırları
- Askılar
- Taşınabilir sehpa
- Higrometre ve termometre





Temizlik Ağlarının Gözenek Ölçüleri:

- 1. ve 2. yaşlar için 2 mm²
- 3. yaş için 10 mm²
- 4. ve 5. yaşlar için 20 mm²