

12. Hafta

Oğlakların Beslenmesi

Kolostrum ile Besleme

Yeni doğan oğlaklar için en uygun besin maddesi kolostrumdur. Kolostrumun besin maddeleri bakımından zengin olması, bağışıklık sistemini güçlendirici immünoglobulin gibi maddeleri içermesi nedeniyle doğumdan sonraki ilk saatlerde acilen verilmelidir. Kolostrumun alınma zamanı ve miktarı, hastalıklara karşı direnç göstermesini etkilemektedir. Kolostrumun yapısındaki antikorların miktarı ilk 24 saatten sonra hızla azalmaktadır. Bu nedenle ilk 15-30 dakika içerisinde alınmaya başlanması gereklidir. Oğlaklara verilecek kolostrum miktarı ilk 24 saatte canlı ağırlığın %10'u kadardır. İlk gün 4-5 öğünde her öğünde kg CA için 100-150 ml olacak şekilde, 2. ve 3. günlerde öğün sayısı 3'e, 4. ve 5. günlerde öğün sayısı 2'ye düşürülerek verilecek miktar artırılmalıdır. Ananın sütü fazla ise kolostrum başka bir oğlağa verilebilir veya dondurularak saklanabilir. Dondurarak saklamak için yaşlı hayvanların kolostrumu genç hayvanlara tercih edilmelidir. Çünkü genç hayvanların kolostrumu endemik patojenlere karşı daha az antikor içermektedir. Kolostrum vücut ısısında (38 °C) verilmelidir. Aksi halde pıhtılaşma süresi uzar ve sindirim bozukluklarına neden olur.

Süt Veya Süt İkame Yemi İle Besleme

Oğlakların gelişmesinin sağlıklı olması için 5-8 hafta süt içirilmelidir. Kuzu ve buzağılarda olduğu gibi rumenin gelişmesini sağlamak için 2. haftadan itibaren oğlaklar katı yem (kesif yem ve kuru ot) yemeye alıştırmalıdır. Alıştırma için verilecek yoğun yem en az %18 protein içermelidir. Verilecek kaba yem, iyi kaliteli bol yapraklı (yonca) olmalıdır. Oğlaklar için hazırlanacak başlangıç ve büyütme rasyon örnekleri

Oğlaklar tam yağlı süt, inek sütü veya süt ikame yemi ile de beslenebilirler ve sütçü keçilerde süttten tasarruf edilebilir.

Verilecek süt ikame yeminde (SİY),

1. En az %22-25 HP içermelidir. Süt ürünlerinden yağsız süt tozu, kazein kullanılabilir, süt proteininin %25'i yerine soya proteini ikame edilebilir.

2. SİY %20 HY içermeli, hayvansal yağ veya homojenize edilmiş soya lesitini kullanılabilir, yüksek düzeyde yağ kullanılması büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırdığı gibi diareyi de azaltır.
3. Karbonhidrat kaynağı olarak laktoz ve dekstroz kullanılabilir.
4. Esensiyel mineral ve vitaminlerce zenginleştirilmelidir.

SİY suya karıştırılarak topaklaşmaya meydan vermeden hazırlanır. Süt ikame yemi başlangıçta 3-4 öğünde ve günde 1-1.5 lt ml kadar verilebilir. Daha sonraki günlerde günde 2 kez verilmelidir.

Sütten Kesme

İnek sütü, keçi sütünden daha ucuz olduğundan, oğlakların beslenmesinde inek sütü de kullanılabilir. İşletmede öğütülmüş yulaf, buğday, mısır unu 15 kg, 5 kg küspe ile karıştırılarak başlangıç yemi hazırlanabilir. İlk haftanın sonundan itibaren yemeye alıştırmalıdır. Oğlaklar 5-6. haftadan itibaren 3 aylık yaşa kadar süttten kesilebilirler. Süttten kesme tedrici olmalıdır. Süttten kesilecek oğlağa ılık su verilmelidir, rumen gelişimi için su gereklidir. Oğlaklar doğum ağırlıklarının 3-4 katına ulaştıklarında ya da günde 250 g kesif yem tüketmeye başladıklarında süttten kesilebilirler

Et üretimi için yetiştirilecek oğlaklar bir an önce annelerinden ayrılmalıdır, annelerinden ayrılmayan oğlakların gelişmeleri daha yavaş olmaktadır.

Bir Yaşındakilerin Beslenmesi

Bu hayvanların rumenleri tamamen gelişmiş olduğundan otlaklarda ve kaba yemlerle rahatlıkla beslenebilirler. İyi kaliteli otlak ve mer'alar sağlandığı takdirde, kesif yem takviyesi yapılmadan da beslenebilirler, ancak hızlı gelişme için kesif yem gereklidir. Oğlakların performansı kuzulardan daha yüksek olduğu için rasyonun kalitesi oğlaklar için önemlidir. Kesif yem 1 yaşındakilere hızlı gelişme sağladığı gibi, cinsi olgunluk yaşına ulaşma süresini de kısaltarak yaşam performanslarını yükseltmektedir. Verilecek kesif yemin miktarı, kaba yemin kalitesine bağlı olarak günde hayvan başına 250-400 g kadardır. Kesif yemin protein içeriği%15-16'dan aşağı olmamalıdır.

Tekelerin Beslenmesi

Erkeklerin gelişmeleri dişilere göre daha hızlı olduğundan çiftleşmede kullanılmayacakları zamanda iyi bir mer'a veya iyi kaliteli kaba yem tekeler için idealdir. Tekelere fazla kesif yem

vermek, kısa sürede yağlanmalarına neden olabilir ve cinsel aktivitelerinde gerileme görülebilir.

Çiftleşme sezonunda veya 2-3 hafta önce %12-14 HP'li karma yemden günde 2 kez 500 g verilmeli, çiftleşmeden sonra miktar yavaş yavaş azaltılmalıdır. Fazla canlı ağırlık artışından kaçınılmalıdır. Aşım döneminde verilecek rasyon enerji ve proteince desteklenmelidir. Bu amaçla mısır, yulaf, kepek ve küspelerin rasyonda bulunmasına özen gösterilmelidir. Rasyon vitamin ve minerallerce özellikle vitamin A bakımından desteklenmelidir.