



# Farmasötik Bakım

Ankara Üniversitesi  
Eczacılık Fakültesi



## Risk Faktörleri

- *Bazı örnekler:*
- Yapısal anormallikler
- Nörolojik bozukluklar
- Vezikoureteral reflü



## Mikrobiyoloji:

- *Escherichia coli* (>85%) en yaygın sebep



## Komplike Olmayan Durumlarda

- *ilk tercihler:*
- ko-trimoksazol
- nitrofurantoin



## **Diğer Alternatifler**

- Fosfomisin
- Florokinolonlar
- Beta-laktamlar



## Tekrarlayan Durumlarda

**Düşük doz**

***Bazı örnekler:***

- Ko-trimoxazole
- Nitrofurantoin
- Trimetoprim

## Önlemek için

### *Bazı örnekler:*

- Bol su içmek
- İdrar tutmamak

## Ayaktan Tedavide Uygun Antibiyotik Kullanımı

- Sadece **gerektiğinde** ve gerektiğinde ise
- **dođru antibiyotik** seřilmesi ve
- **dođru dozda** ve
- **dođru sürede** reçete edilmesidir



## İlaç Etkileşimi

- Siprofloksasin ve çok değerlikli katyonlar
- En az 2 saat önce veya 6 saat sonra uygulayın