

## Ters Laplace Dönüşümleri

**Tanım 1.**  $\mathcal{L}\{f\} = F(s)$  özelliğini sağlayan  $f(x)$  fonksiyonuna  $F$  in ters Laplace dönüşümü denir ve  $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$  ile gösterilir.

**Örnek 1.** (a)  $\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$  olduğundan,  $\frac{1}{s}$  in ters Laplace dönüşümü  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$  dir.

(b)  $\mathcal{L}\{e^{ax}\} = \frac{1}{s-a}$ ,  $s > a$ , olduğundan,  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{ax}$  dir.

**Teorem 1. (Lineerlik Özelliği)**  $\mathcal{L}\{f_i\} = F(s)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , ve  $c_1, c_2, \dots, c_n$  sabitler olmak üzere

$$\mathcal{L}^{-1}\{c_1F_1 + c_2F_2 + \dots + c_nF_n\} = c_1\mathcal{L}^{-1}\{F_1\} + c_2\mathcal{L}^{-1}\{F_2\} + \dots + c_n\mathcal{L}^{-1}\{F_n\}$$

dir.

**Örnek 2.** (a)  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s+2}{s^2-3s+2}\right\} = ?$  (b)  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s+8}{s^2+2s+5}\right\} = ?$

**Çözüm.** (a)

$$\frac{3s+2}{s^2-3s+2} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-2}$$

şeklinde basit kesirlerine ayrılsa,  $A = -5$  ve  $B = 8$  bulunur. O halde ters Laplace dönüşümünün lineerlik özelliğinden

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s+2}{s^2-3s+2}\right\} &= -5\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} + 8\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} \\ &= -5e^x + 8e^{2x} \end{aligned}$$

elde edilir.

(b)  $s^2 + 2s + 5 = (s+1)^2 + 4$  olduğu göz önüne alınsa

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s+8}{s^2+2s+5}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s+3}{(s+1)^2+4}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5}{(s+1)^2+4}\right\} \\ &= 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2+4}\right\} + \frac{5}{2}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+1)^2+4}\right\} \\ &= 3e^{-x} \cos 2x + \frac{5}{2}e^{-x} \sin 2x \end{aligned}$$

bulunur, burada  $\mathcal{L}\{e^{bx} \cos ax\} = \frac{s-b}{(s-b)^2+a^2}$  ( $s > b$ ) ve  $\mathcal{L}\{e^{bx} \sin ax\} = \frac{a}{(s-b)^2+a^2}$  ( $s > b$ ) özellikleri kullanılmıştır.

## Konvolüsyon

**Tanım 2.**  $f(x)$  ve  $g(x)$  fonksiyonlarının konvolüsyonu

$$f * g = \int_0^x f(t)g(x-t) dt$$

şeklinde tanımlıdır.

**Uyarı 1.**  $f * g = g * f$  dir.

**Teorem 2. (Konvolüsyon Teoremi)**  $\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s)$  ve  $\mathcal{L}\{g(x)\} = G(s)$  olsun. Bu durumda

$$\mathcal{L}\{f(x) * g(x)\} = F(s)G(s)$$

dir.

## Konvolusyon Türünde İntegral Denklemler

$$\int_0^x u(t)v(x-t)dt$$

şeklinde bir integrale konvolüsyon türü bir integral denir.

**Örnek 3.**  $h(x) = \int_0^x t^7(x-t)^5 dt$  integralini hesaplayınız.

**Cözüm.**  $f(x) = x^7$ ,  $g(x) = x^5$  olmak üzere

$$h(x) = f * g$$

dir. Konvolüsyon teoreminden

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{h(x)\} &= \mathcal{L}\{f(x) * g(x)\} \\ &= F(s)G(s) \\ &= \frac{7!}{s^8} \frac{5!}{s^6} \\ &= \frac{(7!)(5!)}{s^{14}} \end{aligned}$$

bulunur. O halde  $h(x) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(7!)(5!)}{s^{14}}\right\} = \frac{(7!)(5!)}{13!}x^{13}$  elde edilir.

## Volterra İntegral Denklemi

$$y(x) = f(x) + \int_0^x k(x-t)y(t)dt \quad (1)$$

şeklinde bir integral Volterra integral denklemi adını alır, burada  $f$  ve  $k$  verilen fonksiyonlar olup  $y$  bilinmeyendir. (1) deki integral konvolüsyon türünde bir integral olduğundan Konvoltisyon teoremi yardımıyla çözüm bulunabilir.

(1) in her iki yanına Laplace dönüşümü uygulanıp  $Y(s)$  çözülürse,

$$Y(s) = \frac{F(s)}{1 - K(s)} \quad (2)$$

elde edilir, burada  $Y(s) = \mathcal{L}\{y(x)\}$ ,  $F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\}$  ve  $K(s) = \mathcal{L}\{k(x)\}$  dir. (2) nin her iki yanına ters Laplace dönüşümü uygulanırsa, (1) integral denkleminin çözümü

$$y(x) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(s)}{1 - K(s)}\right\}$$

bulunur.

### Örnek 4.

$$y(x) = 1 + 2 \int_0^x e^{-2(x-t)}y(t)dt \quad (3)$$

integral denklemini çözünüz.

**Çözüm.** (3) denkleminin her iki yanına Laplace dönüşümü uygulanırsa

$$Y(s) = \frac{1}{s} + \frac{2}{s^2}$$

elde edilir. Buradan

$$\begin{aligned} y(x) &= \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2}\right\} \\ &= 1 + 2x \end{aligned}$$

bulunur.

## Birim Basamak Fonksiyonu

**Tanım 3.**

$$u(x - c) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c, \end{cases}$$

şeklinde tanımlı fonksiyona birim basamak fonksiyonu denir.

**Teorem 3.**  $g, [0, \infty)$  üzerinde tanımlı bir fonksiyon olsun ve  $c \geq 0$  olmak üzere  $\mathcal{L}\{g(x + c)\}$  dönüşümü  $s > a$  için mevcut olsun.

Bu durumda  $\mathcal{L}\{u(x - c)g(x)\}$  dönüşümü de  $s > a$  için mevcut olup

$$\mathcal{L}\{u(x - c)g(x)\} = e^{-cs}\mathcal{L}\{g(x + c)\}$$

dir.

**Örnek 5.**

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & 0 \leq x \leq 2, \\ 3x, & x \geq 2, \end{cases}$$

fonksiyonunun Laplace dönüşümünü hesaplayınız.

**Cözüm.**  $f(x) = 2x + 1 + (x - 1)u(x - 2)$  şeklinde yazılabilir. Teorem 3 göz önüne alınırsa,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f(x)\} &= \mathcal{L}\{2x + 1\} + \mathcal{L}\{(x - 1)u(x - 2)\} \\ &= \mathcal{L}\{2x\} + \mathcal{L}\{1\} + e^{-2s}\mathcal{L}\{x + 1\} \\ &= \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s} + e^{-2s}\left(\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s}\right) \end{aligned}$$

bulunur.

**Teorem 4.**  $c \geq 0$  ve  $s > a$  için  $\mathcal{L}\{g\}$  mevcut olsun. Bu durumda  $s > a$  için  $\mathcal{L}\{u(x - c)g(x - c)\}$  mevcut olup

$$\mathcal{L}\{u(x - c)g(x - c)\} = e^{-cs}\mathcal{L}\{g(x)\} \quad (4)$$

dir.

**Örnek 6.**  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2}\right\} = ?$

**Cözüm.** (4) eşitliğinden

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-cs}G(s)\} = u(x - c)g(x - c) \quad (5)$$

dir, burada  $G(s) = \mathcal{L}\{g(x)\}$  dir.  $c = 2$  ve  $G(s) = \frac{1}{s^2}$  olmak üzere (5) özelliği göz önüne alınırsa

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{s^2} \right\} &= u(x-2)(x-2) \\ &= \begin{cases} 0, & x < 2, \\ x-2, & x \geq 2, \end{cases}\end{aligned}$$

elde edilir.