

3. GAMMA VE BETA FONKSİYONLARI

Gamma Fonksiyonu

$$\Gamma(n) = \int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-x} dx$$

integrali, $n > 0$ için yakınsaktır, $n \leq 0$ için ise ıraksaktır.

Örnek 1. $n \in \mathbb{N}$ için $\Gamma(n) = (n-1)!$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm.

$$\begin{aligned} \Gamma(n) &= \int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-x} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t x^{n-1} e^{-x} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ (x^{n-1} e^{-x}) \Big|_0^t + \int_0^t (n-1) x^{n-2} e^{-x} dx \right\} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ -\frac{t^{n-1}}{e^t} + 0 \right\} + \lim_{t \rightarrow \infty} (n-1) \int_0^t e^{-x} x^{n-2} dx \\ &= (n-1) \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t x^{n-2} e^{-x} dx \\ &= (n-1) \underbrace{\int_0^{\infty} x^{n-2} e^{-x} dx}_{\Gamma(n-1)} \end{aligned}$$

Yukarıdaki yöntemi $\Gamma(n-1)$ 'e uygularsak,

$$\begin{aligned}\Gamma(n) &= (n-1)(n-2)\Gamma(n-2) \\ &= (n-1)(n-2)\dots\underbrace{1}_{1}\Gamma(1)\end{aligned}$$

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

NOT 1. $\forall t > 0$ için $\Gamma(t) = \frac{1}{t}\Gamma(t+1)$ olduğu biliniyor.

Bundan yararlanarak Γ fonksiyonunun tanım kümesi daha da genişletebiliriz. Eğer $-1 < t < 0 \implies 0 < t+1 < 1$ olduğundan $\Gamma(n+1)$ integrali mevcuttur. Yukarıdaki nottan $\Gamma(t)$ mevcuttur. Demek ki $-1 < t < 0$ için $\Gamma(t)$ mevcuttur.

Benzer şekilde $-2 < t < -1 \implies \Gamma(n+1)$ anlamlıdır (mevcut). Benzer yöntem ile $-n < t < -n+1 \implies \Gamma(t)$ anlamlıdır.

Böylece Γ fonksiyonunun tanım kümesini $\mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$ olarak alabiliriz.

Örnek 2. $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ olduğu biliniyor. Buna göre $\Gamma(\frac{1}{2}) = ?$

$$\begin{aligned}\text{Çözüm. } \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_0^{\infty} x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx && (x = t^2 \implies dx = 2t dt) \\ &= \int_0^{\infty} (t^2)^{-\frac{1}{2}} e^{-t^2} 2t dt \\ &= 2 \int_0^{\infty} t^{-1} t e^{-t^2} dt \\ &= 2 \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &= \sqrt{\pi}\end{aligned}$$

Ödev 1. Yukarıdaki integralden yararlanarak $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$ 'yi hesaplayınız.

Beta Fonksiyonu

$$\beta(m, n) = \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx$$

integrali $m > 0$ ve $n > 0$ için yakınsaktır. Diğer durumlarda ıraksaktır.

Ayrıca,

$$\begin{aligned} 1) \beta(m, n) &= \beta(n, m) \\ 2) \beta(m, n) &= 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2m-1} \theta \cos^{2n-1} \theta d\theta \end{aligned}$$

sağlanır, gösteriniz.

NOT 2. $\beta(m, n) = \frac{\Gamma(m) \Gamma(n)}{\Gamma(m+n)}$ bağıntısı gerçekleşir.

Örnek 3. $\int_0^1 x^4 (1-x)^3 dx$ integralini hesaplayınız.

Çözüm. $\beta(m, n) = \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx$

$$m - 1 = 4 \implies m = 5$$

$$n - 1 = 3 \implies n = 4$$

$$\text{O halde, } \beta(5, 4) = \frac{\Gamma(5) \Gamma(4)}{\Gamma(5+4)} = \frac{4!3!}{8!} = \frac{1}{280}$$

Ödev 2. $\int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{2-x}} dx$ integralini hesaplayınız.