

YERFISTIĐI ZARARLILARI (7)

Yerfistiđinde Mayıs BÖceđi

Melolontha melolontha

Coleoptera: Scarabaeidae

Bir diři ortalama 60 kadar yumurta bırakabilir. Larvalar, ilk dönemlerinde toprak yüzeyine yakın kökler üzerinde beslendikleriniirler. Fakat ikinci dönem ve daha sonraki larvalar daha derinlere indiklerinden bitkinin kök sistemini tamamen tahrip edebilirler. Sonbaharda kışı geçirmek için toprađın derinliklerine inerler.

Yerfistiđinde Kırmızı Örumcek

Tetranychus urticae

Tetranychus cinnabarinus

Yumurtalar yaprakların alt yüzeyine tek tek konur. Diřiler yumurta bırakmadan önce yumurta veya yumurtalarını bırakacakları ađları örerler. Ađların çokluđu populasyonun yoğun olduđunu gösterir.

Zararlı genellikle yaprakların alt yüzlerinde bulunur ve buralarda ađ meydana getirir. Yaprakların alt yüzeyinde bitkinin öz suyunu emmek suretiyle beslenerek önce yaprakların sararmasına daha sonra kurummasına neden olurlar. Yaprakların kuruması ve zamanla dökülmesi meyve teşekkülünün azalmasına neden olur.