















4 11:59



# KÖPEKLERDE MEME TÜMÖRÜ OLGUSUNDA İZLENMESİ GEREKEN STRATEJİ (1)

## 1-LOKAL OLGULARDA

### BENİNG TÜMÖRLER

*TEDAVİ*-----LUMPEKTOMİ

*POST. OP.* -----YILDA 2 KONTROL+AKCİĞER  
RADYOGRAFİSİ

### SINIRLANMIŞ MALİGN TÜMÖRLER

*TEDAVİ*-----RADİKAL MASTEKTOMİ

*POST.OP.*-----2 AY ARAYLA KONTROL+AKCİĞER  
RADYOGRAFİSİ

### İNVASİVE KARSİNOM

*TEDAVİ*----- RADİKAL MASTEKTOMİ

*POST.OP.*-----HER AY KONTROL+3 AYDA BİR  
AKCİĞER RADYOGRAFİ

# KÖPEKLERDE MEME TÜMÖRÜ OLGUSUNDA İZLENMESİ GEREKEN STRATEJİ (2)

## 2-YAYILMIŞ OLGU

**LOKAL VEYA BAŞKA YERE METASTAZ**

***TEDAVİ*-----RADİKAL MASTEKTOMİ**

***POST.OP.*-----\*HER AY KONTROL**

**\*2 AYDA BİR AKÇİĞER RADYOGRAFİSİ**

**\*İMMUNOTERAPİ**

**\*KEMOTERAPİ**



# OPERASYON SONRASI BAKIM

**Operasyon sonrası şiddetli ağrı olur.**

**Analjezi için morfin (0.2-2 mg/kg im/sc 6 saat ara ile), oksimorfin, meperidine, aspirin, flunixin meglumine veya ibuprofen kullanılır.**

**Operasyon sonrası antibiyotik (penisilin veya sefalosporin) uygulanmalıdır.**



**Kontroller operasyon sonrası;**

**1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ve 12. aylarda yapılmalıdır.**

**Dikişler operasyondan 10-14 gün sonra alınmalıdır.**

# OPERASYON SONRASI OLASI KOMPLİKASYONLAR

**SERÖZ SIVI TOPLANMASI (punksiyon)**

**ENFEKSİYON (lokal antibiyotik)**

- \* Küçük yaralar (lokal tedavi)
- \* Büyük yaralar (temizlenme, dikiş)

**ARKA BACAKLARDA ÖDEM (ekzersiz, masaj, diüretik)**