

İMMUNOPROFİLAKSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ,
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

HAYVANLARDA AŞILAMA

Köpeklerde aşılama

AŞI TARİHİ	ZORUNLU AŞILAR	OPSİYONEL AŞILAR
6-8 HAFTA	DHPP	<i>Bordatella bronchiseptica</i>
10-12 HAFTA	DHLPP	Canine Coronavirus
12-16 HAFTA	DHLPP-KUDUZ*	Lyme
HER YIL	DHLPP-KUDUZ*	<i>Bordatella</i> -Coronavirus-Lyme

DHPP: Canine Distemper (Panleukopenia virus)-Hepatitis (Canine Adenovirus)-Canine Parainfluenza virus-Canine Parvovirus

DHLPP: Distemper-Hepatitis-Leptospirosis-Parainfluenza-Parvovirus

*Uygulanacak herhangi 2 aşının arasındaki sürenin en az 2 hafta olması gerekir.

Köpeklerde aşılama

Canine Distemper

Etken Panleukopenia virus

Gençlik hastalığı

Solunum, sindirim ve sinir sisteminde bozukluklar

Oldukça bulaşıcı bir enfeksiyon

Mortalite yüksek, yavrularda yaygın

Canine Hepatitis

Etken Canine Adenovirus

KC enfeksiyonu

Ateş, kusma, halsizlik, ishal, depresyon

Parainfluenza

Etken Canine Parainfluenza virus

Üst solunum yolu enfeksiyonu

Parvoviral Enteritis

Etken Canine Parvovirus

Sindirim sisteminde kanama odakları, kanlı ishal ve ölüm

Leptospirosis

Etken *Leptospira* spp.

Kronik enfeksiyon

Kanlı idrar, kanlı ishal, sarılık, böbrek enfeksiyonları

Kedilerde Aşılama

AŞI TARİHİ	ZORUNLU AŞILAR	OPSİYONEL AŞILAR
6-8 HAFTA	DRC	Chlamydia felis
10-12 HAFTA	DRC	Feline Leukemia
12-14 HAFTA	KUDUZ	
14-16 HAFTA	DRC	
HER YIL	DRC-KUDUZ*	Chlamydia-Feline Leukemia*

DRC: Feline Distemper (Panleukopenia virus)-Feline Rhinotracheitis (Herpes virus)-Feline Calicivirus

*Uygulanacak herhangi 2 aşının arasındaki sürenin en az 2 hafta olması gerekir

Kedilerde Aşılama

Feline Distemper

Etken Panleukopenia virus

Gençlik hastalığı

Oldukça bulaşıcı bir enfeksiyon, kusma, kanlı ishal

Mortalite yüksek, yavrularda yaygın

Feline Rhinotracheitis

Etken Herpes virus-1

Kedi gribi, kedi nezlesi olarak bilinir

Üst solunum yolu enfeksiyonu

Feline Calicivirus Enfeksiyonu

Etken Feline Calicivirus

Üst solunum yolu enfeksiyonu

Sistemik tutulum görülebilir