

GÜNEŞ'İN BOYLAM HAREKETİ (Görünen Yıllık Hareketi)

Güneş'in Yer merkezli yörünge elipsi üzerindeki yeri :

1- Güneş'in görünürdeki yörüngesi ile Yer'in üzerinde dolandığı gerçek yörünge elipsi aynı düzlem üzerindedirler ki bu düzleme ekliptik (TUTULUM) düzlemi denir.

2- Yer, görünürdeki yörünge elipsinin odaklarından biri üzerindedir.

3- Büyüklük ve biçim olarak bu iki elips özdeşdir. Yani her ikisi için de,

$$a = A = 149600 \times 10^6 \text{ m}$$

$$e = 0.01675104 - 0.00004180 T$$

dir. Burada T, 1900 den sonraki yüzyıl sayısıdır.


4- Her iki yörünge için dolanma dönemi,

$$P_{\odot} = 365^{\circ}.25636042 + 0^{\circ}.00000011 T$$

dir. Bu döneme "1 yıldızıl yıl" denir.

5- Her iki devinme de (+) yönlüdür.

6- Kepler yasaları her iki yörünge için aynen geçerlidir.



$\beta_0 \approx 0^\circ = \text{sabit}$ (tutulum enlemi)

λ_0 ; deđiřir. Bu yüzden “Güneř’in boylamsal hareketi” denir.

$\lambda_0 = \text{Günberi boylamı}$ (γ dan itibaren ölçölür)

$t_0 = \text{Güneř’in günberiden geçiř anı}$ (geçme tarihi)

$v = \text{Gerçek anomali}$ (ayrıklık)

$r = \text{yarıçap vektörü}$ (t anındaki Yer-Güneř uzaklıđı)

t anında Güneř G de olsun. $\lambda = \lambda_0 + v$ dir.

t anında $r, v = ?$ Yani verilen bir t anında Güneř’in yörüngedeki **YERİ** neresidir ?

SORUN : t verilmiřken (r, v) nin bulunmasıdır.

Özetlersek,

<u>Bilinenler</u>	<u>Verilen</u>	<u>İstenen</u>
P_0	t zamanı	r
t_0		v
λ_0		λ
a		
e		

$$\begin{aligned}\lambda_0 &= 281^\circ 13' 15''.0 + 6189''.03 T + 1''.63 T^2 \\ &= 281^\circ.22083 + 0^\circ.0000470684 d + 0^\circ.000453 T^2 \quad \dots(1)\end{aligned}$$

Burada d , 1900.0 yılı ya da JT 2415020.0 den sonra geçen gün sayısıdır. Günberiden geçiş tarihi olan t_0 her yıl yıllıklardan alınır.

Elipsin odağa göre kutupsal denklemi,

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v}$$

Elipsin merkeze göre kutupsal denklemi,

$$r = a (1 - e \cos u)$$

dir. u (dış anomali) ile v (gerçek anomali) arasındaki bağıntı,

$$\tan \frac{v}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{u}{2}$$

$t - t_0$ = Güneş'in **P** den **G** ye gelmesi için geçen süre

$t - t_0$ süresince yarıçap vektörünün taradığı alan GYP alanıdır. Şekilden,

$$\text{GYP alanı} = \text{GOP alanı} - \text{GOY alanı}$$

Şimdi bu alanları bulmaya çalışalım :

P_0 süresince yarıçap vektörünün süpürdüğü alan = elipsin alanı = πab

$$\text{Birim zamanda süpürülen alan} = \frac{\pi ab}{P_{\odot}}$$

$$t - t_0 \text{ süresi içinde taranan alan} = \text{GYP alanı} = \frac{\pi ab}{P_{\odot}} (t - t_0)$$

Diğer taraftan,

2π açısına πab alanı karşılık gelirse
 u açısına **GOP** alanı karşılık gelir.

Buradan,

$$GOP \text{ alanı} = \pi ab \frac{u}{2\pi}$$

elde edilir.

$\triangle GOY$ bir düzlem üçgenidir :

$$\overline{OY} = c = ae \quad , \quad GY = r \quad , \quad \hat{GYO} = 180^\circ - v$$

$$GOY \text{ alanı} = \frac{1}{2} \overset{e}{aer} \sin(180 - v) \quad \left[\text{Alan} = S = \frac{1}{2} ab \sin C \right]$$

$$GOY \text{ alanı} = \frac{1}{2} aer \sin v$$

$$r \sin v = GH = b \sin u \quad (\text{K noktası yedek çember üzerinde old. dan } \overline{OK} = b \text{ dir})$$

O zaman,

$$GOY \text{ alanı} = \frac{1}{2} aeb \sin u \quad \text{olur.}$$

Bunları yerine koyarsak,

$$\frac{\pi ab}{P_{\odot}}(t - t_o) = \frac{\pi abu}{2\pi} - \frac{1}{2} aeb \sin u$$

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{P_{\odot}}(t - t_o) &= \frac{u}{2} - \frac{1}{2} e \sin u \\ &= \frac{1}{2}(u - e \sin u) \end{aligned}$$

veya,

$$u - e \sin u = \frac{2\pi}{P_{\odot}}(t - t_o)$$

elde edilir ki bu, Aci - zaman iliskisi ni veren Kepler denklemidir.

$$\frac{2\pi}{P_{\odot}}(t - t_o) = M \quad : \text{Ortalama anomali}$$

olmak uzere bu denklem,

$$u - e \sin u = M$$

sekinde olur. Bu denklemi n cozumu bize u acisi ni verir.

u ve v ayırıklıkları zamanla düzgün olmayan bir şekilde değişirler. Oysa M zamanla doğrusal olarak değişir. Ancak bu üç açının ortak özelliği şudur :

$$v = 0^\circ \quad \text{iken} \quad u = 0^\circ \quad \text{ve} \quad M = 0^\circ$$

$$v = 180^\circ \quad \text{iken} \quad u = 180^\circ \quad \text{ve} \quad M = 180^\circ \quad \text{dir.}$$

Sorun bu denklemin çözümüdür. Bilinmeyen u açısının hem doğrusal terimde ve hem de sinüs teriminde olması işi zorlaştırmaktadır. Çözüm yapılırken $u(\text{rad})$ olarak alınmalıdır. Kesin bir çözüm gösterilememektedir. Çözüm için yararlı olan üç yöntem aşağıdaki gibi özetlenebilir. İlk iki yöntem yaklaştırma yöntemidir ve e dış merkezliğinin Yer gibi küçük olduğu durumlarda kullanılabilir. Çizelgeleme yöntemi ise daha genel olan bir yöntemdir.

1- Art ardına yaklaştırma yöntemi

$$u - e \sin u = M \quad \Rightarrow \quad u = M + e \sin u$$

1. a dim $u_1 \cong M$ (Kucuk e ler icin)

O zaman $u_2 = M + e \sin M$ yazilabilir.

Bu ifade denklemde konursa,

$$u_3 = M + e \sin(M + e \sin M) \quad \text{yazilabilir.}$$

$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ idi. O zaman,

$$u_3 = M + e \sin M \cos(e \sin M) + e \cos M \sin(e \sin M)$$

$e \ll 1$, $\sin M \leq 1 \Rightarrow e \sin M \ll 1$, $\cos(e \sin M) \cong 1$

$\sin(e \sin M) = e \sin M$ (Kucuk acilarin $\sin.$ yerine kendisi alinabilir)

olacagindan,

$$u_3 = M + e \sin M + e \cos M e \sin M$$

$$u_3 = M + e \sin M + e^2 \sin M \cos M$$

$$\sin(M + M) = 2 \sin M \cos M = \sin 2M$$

$$\frac{1}{2} \sin 2M = \sin M \cos M$$

den yararlanarak,

$$u_3 = M + e \sin M + \frac{e^2}{2} \sin 2M \quad \text{olur. Veya,}$$

Yaklastirma surdurulurse,

$$u \cong M + \left(e - \frac{e^3}{8} \right) \sin M + \frac{1}{2} e^2 \sin 2M + \underbrace{\frac{3}{8} e^3 \sin 3M + \dots}_{\text{atılabilir}}$$

2- Seriyeye açma yöntemi

$$r \sin v = b \sin u \Rightarrow \sin v = \frac{b \sin u}{r}$$

$$r = a(1 - e \cos u) \Rightarrow \sin v = \frac{b \sin u}{a(1 - e \cos u)} \quad \text{olur.}$$

$$b = a\sqrt{1 - e^2} \Rightarrow \sin v = \frac{a\sqrt{1 - e^2} \sin u}{a(1 - e \cos u)}$$

$$\sin v = \frac{\sqrt{1 - e^2} \sin u}{(1 - e \cos u)}$$

Diger tarafta n,

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v} = a(1 - e \cos u)$$

$$1 - e \cos u = \frac{1 - e^2}{1 + e \cos v} \Rightarrow \cos v = \frac{\cos u - e}{1 - e \cos u}$$

$$\sin(v - u) = \sin v \cos u - \cos v \sin u$$

$$\sin(v - u) = \frac{\sqrt{1 - e^2} \sin u}{1 - e \cos u} \cos u - \frac{\cos u - e}{1 - e \cos u} \sin u$$

$$\sin(v - u) = \frac{\overbrace{\sqrt{1 - e^2}}^{\approx 1} \sin u \cos u - \sin u \cos u + e \sin u}{1 - \underbrace{e \cos u}_{\approx 0}}$$

$$\sin(v - u) \cong e \sin u$$

$$\sin X = X - \frac{X^3}{3!} + \frac{X^5}{5!} - \frac{X^7}{7!} + \dots \quad \text{idi(Taylor acili mi)}$$

Buna gore,

$$\sin(v-u) = (v-u) - \frac{(v-u)^3}{3!} + \frac{(v-u)^5}{5!} - \dots \cong e \sin u$$

$$u \cong M + e \sin M + \frac{e^2}{2} \sin 2M \quad \text{bulunmustu, ve}$$

$$u = M + e \sin u \quad \text{idi. O zaman,}$$

$$M + e \sin u = M + e \sin M + \frac{e^2}{2} \sin 2M \quad \text{yazilabilir.}$$

$$e \sin u \cong e \sin M + \frac{e^2}{2} \sin 2M \quad \text{olacagindan,}$$

$$(v-u) - \frac{\overbrace{(v-u)^3}^{\approx 0}}{3!} + \frac{\overbrace{(v-u)^5}^{\approx 0}}{5!} - \dots \cong e \sin M + \frac{e^2}{2} \sin 2M$$

$$v-u \cong e \sin M + \frac{e^2}{2} \sin 2M + \dots$$

$$v \cong u + e \sin M + \frac{e^2}{2} \sin 2M + \dots \quad \text{olur.}$$

$$u \cong M + e \sin M + \frac{e^2}{2} \sin 2M + \dots \quad \text{idi. } O \text{ zaman,}$$

$$v \cong M + 2e \sin M + e^2 \sin 2M + \frac{e^3}{6} \sin^3 M + \frac{e^4}{4} \sin^2 M \sin 2M + \dots$$

elde edilir.

3- Çizelgelerle çözüm

$e =$ dış merkezlik = sabit (yani belli)

$$u \qquad M = u - e \sin u$$

0° veya $0 \text{ rad} \rightarrow \dots$

$\dots \rightarrow \dots$

$360^\circ \quad 2\pi \rightarrow \dots$

Şeklinde hesap yapılarak çizelge oluşturulur. Aralıklar yeterince sık ise ara değer hesabı da yapılabilir.

Bu yöntem **En uygun yöntemdir.**

t anında Güneş, yörüngesinin hangi noktasındadır ?

Güneş'in t anında yörüngesi üzerindeki yerini belirlemek için ;

İzlenecek yol,

$$1- M = \frac{2\pi}{P_{\odot}}(t-t_0)$$

$$M = \frac{360^{\circ}}{365.2564}(t-t_0)$$

$$M = 0.9856(t-t_0) \quad \text{dan } M \text{ bulunur.}$$

2- $v = f(M)$ serisi nden, yani,

$$v \cong M + 2e \sin M + e^2 \sin 2M + \frac{e^3}{6} \sin^3 M + \dots$$

veya $e = 0.016719$ değeri ile,

$$v = M + 115' 2 \sin M + 58'' \sin 2M + 0''.32 \sin^3 M + \dots$$

M belli $\rightarrow v$ gercek anomali bulunur.

3- $\lambda_{\odot} = \lambda_0 + v$;(1) den $\lambda_0 \rightarrow \lambda_{\odot}$ bulunur.

$$4- \quad r = \frac{a(1-e^2)}{1+e \cos v} \quad ; \quad a = \text{ortalama Yer - Gunes uzakligi}$$

Buradan r bulunur.

Veya a ya göre ($a = 149.6 \times 10^6$ km) bagil uzaklik,

$$\frac{r}{a} = \frac{1-e^2}{1+e \cos v} \quad \Rightarrow \quad \frac{r}{a} \quad \text{bulunur.}$$

Boylece $G(r, v)$ bulunmus olur.

Sanal Güneş ve Gerçek Güneş

$$\lambda_o = \lambda_o + v \quad , \quad v = M + C(t) \quad \text{ise,}$$

$$\lambda_o = \lambda_o + M + C(t) \quad \text{dir.}$$

Burada,

$$C(t) = 2e \sin M + e^2 \sin 2M + \frac{e^3}{6} \sin^3 M + \dots$$

dir.

- Güneş'in görünürdeki yörüngesi çember olsaydı, $e = 0 \rightarrow C(t) = 0$,
O zaman,

$$\lambda_o = \lambda_s + M \quad \text{olurdu.}$$

Güneş elipsin merkezinden $c = ae$ kadar kaymış durumdadır.
Dolayısıyla $C(t)$ de $c = ae$ kadar kaymış durumdadır. Bu nedenle
 $C(t)$ ye "Merkezin denklemi" denir.

Sanal Güneş'i düşünelim : $\lambda_s = \lambda_o + M$ olsa,

O zaman Gerçek Güneş ile Sanal Güneş arasında,

$$\lambda_o = \lambda_s + C(t)$$

olurdu. Buna göre,

$C(t) > 0$ ise, $\lambda_o > \lambda_s$ olurdu, Yani gerçek güneş sanal güneşin önünde gider.

$C(t) < 0$ ise, $\lambda_o < \lambda_s$ olurdu, Yani gerçek güneş sanal güneşin gerisinde ilerler.

$C(t) = 0$ ise, $\lambda_o = \lambda_s$ olur, Yani gerçek güneş ile sanal güneş çakışır, bir an için beraber bulunurlar.

Bu durumda Gerçek Güneş Sanal Güneş'in iki yanında yıl boyunca salınım yapıyor. Salınmayı gösteren ifade $C(t)$ dir. Bu salınımın genliği,

$$2e = 115'.2 \quad \text{dir.}$$

Batlamyus bu salınımın genliğini 143'

Kopernik ise bu salınımın genliğini 111'

bulmuştur. Bu durumda boylamsal hareket sabit bir hızla olmamaktadır. **Acaba bu boylamsal hareketin hızı nedir ? Yani birim zamanda alınan yol nedir ?**

Boylamsal hızın hesabı :

$$\lambda_{\odot} = \lambda_o + M + C(t) \quad \text{idi. Veya acarsak,}$$

$$\lambda_{\odot} = \lambda_o + M + 2e \sin M + e^2 \sin 2M + \frac{e^3}{6} \sin^3 M + \dots$$

$$\text{Boylam hizi } \frac{d\lambda_{\odot}}{dt} \text{ dir. } \lambda_o = \text{sabit} \left(\frac{d\lambda_o}{dt} = 0 \right)$$

$$\frac{d\lambda_{\odot}}{dt} = \frac{dM}{dt} + 2e \cos M \frac{dM}{dt} + 2e^2 \cos 2M \frac{dM}{dt} + \dots$$

$$M = \frac{360^\circ}{P} (t - t_o) \Rightarrow \frac{dM}{dt} = \frac{360^\circ}{365.2564} = 3548''.198 \text{ gun}^{-1}$$

$$\frac{dM}{dt} = 0.0172 \text{ rad / gun}$$

$$e = 0.016719 \Rightarrow 2e = 0.03215 \text{ rad}$$

$$2e \frac{dM}{dt} = 0.03215 \times 0.0172$$

$$= 118''.6$$

$$2e^2 \frac{dM}{dt} = 1''.987 \quad \text{Bunlari ifadede yerine koyarsak,}$$


$$\frac{d\lambda_{\odot}}{dt} = 3548''.198 + 118''.6 \cos M + 1''.987 \cos 2M + \dots \text{ gun}^{-1}$$

sonucu bulunur.

SONUÇ:

- 1- Gerçek Güneş Sanal Güneş'e göre salınım hareketi yapar,
- 2- Bu salınımın genliği 115'.2 dir
- 3- Güneş'in Yer'e olan uzaklığı sürekli değişir

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \nu}$$



Bu uzaklık sürekli değiştiğinden dolayı da, Güneş'in açısal yarıçapı yıl boyunca değişir. Güneş'in herhangi bir t anındaki uzaklığı r ve bu t anındaki açısal yarıçapı R_\odot ise,

$$\sin R_{\ominus} = \frac{r_{\ominus}}{r} \quad , \quad \text{rad cinsinden ise } R_{\ominus}(\text{rad}) = \frac{r_{\ominus}}{r}$$

$$\text{Ortalama deger } \overline{R_{\ominus}} \text{ ise; } \overline{R_{\ominus}}(\text{rad}) = \frac{r_{\ominus}}{a} \quad ; \quad a = 1 \text{ A.B}$$

Bu iki deger oranlanırsa,


$$\frac{R_{\ominus}}{\overline{R_{\ominus}}} = \frac{r_{\ominus}}{r} \frac{a}{r_{\ominus}} = \frac{a}{r} \quad \text{olur. O zaman,}$$

Herhangi bir t anına ilişkin yaricap,

$$R_{\ominus} = \frac{\overline{R_{\ominus}}}{\frac{r}{a}} \quad \text{dir. } \overline{R_{\ominus}}(\text{aci}) = 16' \quad \text{Yani,}$$

$$R_{\ominus}(\text{aci}) = \frac{16'}{\frac{r}{a}} \quad \text{ile acisal yaricapi bulunur.}$$

r veya $\frac{r}{a}$ onceden hesaplanabilir.



MEVSİM HESABI

Günlerin en uzun ve en kısa olduğu “Gün dönümleri” ile gecenin gündüze eşit olduğu “ılım günleri”, bir yılı dört bölüme ayırır. Bunların her birine “Mevsim” denir. Kuzey ($\varphi > 0$) enlemlerde Gün dönümleri 22 Haziran ve 22 Aralıkta, ılım günleri ise 21 Mart ve 23 Eylül de olur.

21 Mart – 22 Haziran arası İlkbahar,
22 Haziran – 23 Eylül arası Yaz
23 Eylül – 22 Aralık arası Sonbahar
22 Aralık – 21 Mart arası Kış

Güney ($\varphi < 0$) yarıkürede ise,
21 Mart – 22 Haziran arası Sonbahar
22 Haziran – 23 Eylül arası Kış
23 Eylül – 22 Aralık arası İlkbahar
22 Aralık – 21 Mart arası Yaz

olur. Bu tanımlara göre mevsim başlangıçları $\lambda_0 = 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ ve 270° boylamlarda olacaktır. Mevsim hesabında da sorun, Güneş’in bu boylamlara geldiği günleri bulmaktır.

Bunun için iki yol vardır :

1- Elde çizelge veya Almanak var ise, bunlardan yararlanmak,

2- Almanak veya çizelge yok ise aşağıdaki adımları izleyerek hesap yapmak ;

İlkbahar başlangıcı için $\lambda_{\odot} = 0^{\circ}$

Yaz başlangıcı için $\lambda_{\odot} = 90^{\circ}$

Sonbahar başlangıcı için $\lambda_{\odot} = 180^{\circ}$

Kış başlangıcı için $\lambda_{\odot} = 270^{\circ}$

olarak t anını bulmak için,

$$\lambda_{\odot} = \lambda_o + M + C(t) \quad \text{idi} \Rightarrow \lambda_{\odot} = \lambda_o + v$$

$$M = \frac{360^\circ}{P_{\odot}}(t - t_o)$$

$$1^\circ) \lambda_o = 281^\circ 13' 15''.0 + 6189''.03 T + 1''.63 T^2 + 0''.012 T^3$$

$T = 1900.0$ den sonra gecen yuzyil sayisi

$$t = 2009 \text{ icin } T = 1.09$$

Buradan λ_o bulunur.

$$2^\circ) v = \lambda_{\odot} - \lambda_o \quad \text{dan} \quad v \text{ bulunur.}$$

$$3^\circ) e = 0.01675104 - 0.00004180 T \Rightarrow e \text{ bulunur ve,}$$

$$\tan \frac{v}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{u}{2} \Rightarrow u \text{ bulunur.}$$

$$4^\circ) M = u - e \sin u \Rightarrow M \text{ bulunur.}$$

$$5^\circ) M = \frac{360^\circ}{P_{\odot}}(t - t_o) \Rightarrow (t - t_o): \text{Mevsim suresi bulunur.}$$

$$6^\circ) \text{ Eger } t_o \text{ bilinirse } (t - t_o) \text{ dan } t \text{ bulunur.}$$

Her yil icin Gunes'in gunberiden gecme zamani t_o yilliklarda verilir veya formulu kullanilarak hesapla bulunabilir.

Mevsim hesabı ile ilgili örnek çizelge verilecek!

Güneş'in Ekvator (Eşlek) Konsayıları :

QPY küresel ucgeninde(durum ucgeni),

sin *teo.*:

$$\frac{\sin(90 - \delta)}{\sin(90 - \lambda)} = \frac{\sin(90 - \beta)}{\sin(90 + \alpha)}$$

$$\frac{\cos \delta}{\cos \lambda} = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\cos \beta \cos \lambda}{\cos \delta} \quad \dots(1)$$

sin(kenar)cos(aci) formulu;

$$\sin a \cos B = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A$$

$$\sin(90 - \delta) \cos(90 + \alpha) = \cos(90 - \beta) \sin \varepsilon - \sin(90 - \beta) \cos \varepsilon \cos(90 - \lambda)$$

$$-\cos \delta \sin \alpha = \sin \beta \sin \varepsilon - \cos \beta \cos \varepsilon \sin \lambda \quad \dots(2)$$

Gunes icin $\beta = 0^\circ$, (1) ve (2) yi Gunes icin yazarsak,

$$(1) \Rightarrow \cos \alpha_{\odot} = \frac{\cos \lambda_{\odot}}{\cos \delta_{\odot}} \quad \dots(3)$$

$$(2) \Rightarrow +\cos \delta_{\odot} \sin \alpha_{\odot} = +\cos \varepsilon \sin \lambda_{\odot}$$

$$\sin \alpha_{\odot} = \frac{\cos \varepsilon \sin \lambda_{\odot}}{\cos \delta_{\odot}} \quad \dots(4)$$

