

# Ordo:CARNİVORA

- Bu ordoda 11 familya ve yaklaşık 271 tür vardır. Bunların çoğu etle beslenirler. Sindirimi bitkisel materyalden daha kolay olmasına rağmen; eti bulma ve avı öldürmek oldukça zordur. Bu nedenle çoğu karnivor gruplar halinde avlanırlar.

# CARNİVORA

- Birçok karnivor; etle beslenmesine rağmen bu özellik ordonun karakteristik özelliđi deđildir. En önemli özellikleri; diřlerindeki özelleřmedir. Bilim adamları Carnivora ordosunu 2 alt ordoya ayırmıřlardır.1.Feliformia 2. Carniformia (řekil 6.1).

# CARNİVORA

- Avlanma metotları saklanmak ve saklanmak şeklindedir. Ayrıca çok organize av metotları da geliştirmişlerdir. Kürklerinin rengi avlanma sırasında bu hayvanlara önemli derecede kamuflaj sağlar.

# CARNİVORA

- Kürk rengi saklanmaya uygun olmayan karnivorlar; daha planlı avlanma metotları geliştirmişlerdir. Avlanma sırasında avın etkisiz hale getirilmesi son derece önemlidir çünkü yaralanmalar genelde ölümlü sonuçlanır.

# Morfoloji

- En önemli özellikleri dişlerindedir. 4. üst premolar ve 1. alt molar karakteristik özellik gösterir. Köpek dişleri özellikle kedigiller, köpekgiller ve sırtlanlarda çok iyi gelişmiştir. Ayılar gibi omnivor olanlarda köpek dişleri oldukça indirgenmiştir. Yine de tüm karnivorlarda iyi gelişmiş, uzun bir köpek dişi bulunur. Kafatası genelde güçlüdür.

# Familia: Felidae (Kedigiller)

- Avustralya ve Yeni Zelanda hariç tüm dünyada yayılış gösterirler. Ayrıca birçok okyanus adası, kutup bölgesi ve Madagaskar'da bulunmazlar. 18 cins, 36 türe sahiptirler. En önemli özellikleri; rostrumun kısa ve iyi gelişmiş köpek dişlerine sahip olmalarıdır (Şekil 6.5).

# Familia: Hyaenidae (Sırtlanlar)

- Orta Asya, Hindistan ve Afrika'ya özgüdürler ve buralarda en fazla bulunan karnivorlardır. Çayırlar ve çalılık alanlarda yaşarlar. Büyük karnivorlardır. Ağırlıkları 80 kg.a kadar ulaşabilir. Köpek dişleri iyi gelişmiştir ve ayrıca en önemli özellikleri de çenelerinin çok kuvvetli olmasıdır.

# Hyaenidae (Sırtlanlar)

- Genellikle leşler üzerinden beslenirler fakat çok organize ve başarılı avcılardır. Kemik kırmada ünlüdürler. Sırtlanlar çok dikkatli avcılardır ve çevredeki karnivorlarla rekabete girmek istemezler.

# Familia: Canidae (Köpekgiller)

- Bu familyada köpekler, kurtlar, tilkiler, dingolar ve çakallar bulunur. 13 cins, 33 türü vardır. Doğal olarak Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avrupa'da yaşarlar. Dingo (*Canis lupus dingo*) 3500-4000 yıl önce Avustralya, Yeni Gine ve Asya'nın bazı yerlerine taşınmıştır.

# **Familia: Mustelidae (Sansargiller)**

- 25 cins ve 65 türü vardır. Sansarlar, su samurları ve porsuklar bu familyada yer alır. Kuzey yarıkürede çok yaygın bulunurlar. Avustralya, Madagaskar ve diğer okyanus adalarında bulunmazlar. Çok iyi avcılardır. Uzun vücutlu, nispeten kısa bacaklıdırlar. Hem karada hem ağaçlarda yaşarlar.

# **Familia: Ursidae (Ayılar)**

- Kuzey Amerika, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika'nın Atlas Dağları'nda ve Güney Amerika'nın And Dağları'nda bulunurlar. Habitatlari; tropikal ormanlardan, kutup bölgelerine kadar uzanir. 6 cins ve 19 türü vardır.