

# **Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesizlikleri**

**Prof. Dr. Ayhan Filazi**  
**Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi**  
**Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı**  
**2017-18 Bahar Dönemi**

## Sıvı ve Elektrolit Dengeyi Etkileyen İlaçlar

- Evcil hayvanlarda vücuda günlük su giriş-çıkışı: 65-130 ml/kg/gün (Tür, yaş, fizyolojik durum, sıcaklık)
- Sağaltım için toplam vücut suyunun miktarı ve değişik bölmelerdeki dağılımının bilinmesi önemlidir;

Sağlıklı-yetişkin hayvanlarda vücut ağırlığının %55-60'ı,

Genç hayvanlarda %70-75'i,

Besili hayvanlarda ise %50'si

- Vücut suyunun, 2/3'si HİS, kalanını da HDS'dir.

# Sıvı-elektrolit sađaltımının genel ilkeleri

- Hızla yanıtlanması gereken sorular;
  1. Sıvı sađaltımına ne zaman başlanmalı ?
  2. Hangi çözelti kullanılmalı ?
  3. Ne kadar verilmeli ?
  4. Çözelti hangi hızda verilmeli ?
  5. Hangi yolla verilmeli ?
  6. Sađaltımın etkinliđi nasıl deđerlendirilmeli ?
- Bu sorulara dođru cevap verilebilmesi normal homeostatik mekanizmaların iyi bilinmesine bađlıdır.

# Sağaltımın amacı

- Vücuttan fazla su kaybı veya birikmesinin önlenmesi ve elektrolit denge bozukluğunun düzeltilmesidir.
- Bozuklukların nedeni;
  - Sindirim kanalı, böbrek, kalp, karaciğer hastalıkları, travma, ağır yanıklar gibi olayların sonucu
  - Asidoz, alkaloz ve şok durumları
  - Kusma, sürgün, terleme, çene kemiği kırılması, yutak felci, MSS'nin hastalıkları (yeme ve su içme bozulu) gibi durumlar sıvı, elektrolit ve protein kaybına yol açabilir.

# Sodyum dengesi bozuklukları ve sađaltımı

Sodyum vücutta HDS iyonudur

- Vücuda giren suya göre (aynı zamanda sodyum da) vücuttan su kaybının daha fazla olması vücut suyunun azalmasına, tersi ise artmasına sebep olur.
- **Hipotonik** (sodyum kaybı suya göre daha fazla; böbrek yetmezliđi, aldosteron eksikliđi gibi durumlarda oluşur; sodyum  $<135$  mEq/L),
- **İzotonik** (sodyum ve su kaybı eşit; kusma, sürgün gibi durumlarda metabolik asidoz ve alkalozla birlikte),
- **Hipertonik** (su kaybı sodyuma göre daha fazla; terleme, suyun kısıtlanması gibi durumlarda oluşur; sodyum  $>145$  mEq/L) niteliktedir.

# Sodyum dengesi bozuklukları ve sađaltımı

- İzotonik sıvı kaybında izotonik (%0.9) veya hipertonic (%3-5) sodyum klorür;
- Hipertonik sıvı kaybında izotonik sodyum klorür ve glikoz çözeltisi (%5) ayrı ayrı veya birlikte kullanılır.

# Sodyum dengesi bozuklukları ve sađaltımı

- Asidoz ve potasyum kaybının eşlik ettiđi olaylarda (sürgün gibi) laktatlı ringer çözeltisi;
- Hafif alkalozla seyreden durumlarda ringer çözeltisi ve diđer asitleştirici maddeler verilir.
- HDS hacminin artmasıyla giden durumlarda (hipertonik su artışı) esas sebep vücutta aldosteron saliverilmesindeki artıştır. Sađaltım için su kısıtlaması yapılır. Beyinle ilgili belirtilerin ortaya çıkması durumunda %5 sodyum klorür çözeltisinden Di yolla 0.5-2 ml/kg c.a. dozlarda kullanılabilir.

# Potasyum dengesi bozuklukları ve sađaltımı

Potasyum esasta HİS iyonudur;

- HDS'da hidrojen iyonu derişimi yükseldiğinde, potasyumun hücreden dışarıya çıkışı hızlanır; asidozla birlikte, plazmada potasyum seviyesi de yükselir (5-7 mEq/L'ye kadar).
- Potasyum seviyesi 8-9 mEq/L olduğunda kalp hücrelerinin uyarı doğurması ve uyarıyı iletmesi engellenir; sonuçta kalp atışları durur.
- Alkalozda, yukarıdaki aksine, plazmada potasyum seviyesi düşer.



# Potasyum dengesi bozuklukları ve sađaltımı

Plazmada potasyum düzeyi  $<2.5-3$  mEq/L olduđunda, ciddi K eksikliđi belirtileri görölür;

K kaybının sebepleri;

- Ađızdan K alımının azalması,
- Bađırsaklardan atılmasının artması,
- Tiazidler, furosemid, etakrinik asit gibi idrar söktürücüler, kortikosteroid, asidik ilaçlar (salisilatlar, penisilinler gibi), böbrek tuböl hastalıkları, aldosteron salıverilmesinde artış

# Potasyum dengesi bozuklukları ve sađaltımı

- Potasyum noksanlığını düzeltmek için potasyum klorür çözeltisi (%1.14), potasyum fosfat çözeltisi, potasyum asetat çözeltisi, dengeli veya potasyumca zenginleştirilmiş çözeltiler kullanılır.

# Potasyum dengesi bozuklukları ve sađaltımı

- B6brek yetmezliđi halinde, potasyum atılmasının yavaşlaması, doku yıkımı ve hastalık hallerinde (yanık, ađır mikrobiyal hastalıklar, b6y6k ameliyatlarda, yaralanmalar gibi) plazmada potasyum yođunluđu y6kselir.
- Sađaltım iin; sodyum bikarbonat 6zeltisi, hipertonic glikoz 6zeltisi, kalsiyum glukonat 6zeltisi, sodyum polistiren s6lfonat (katyon deđiřtirici reine) kullanılabilir.

# Kalsiyum dengesi bozuklukları ve sađaltımı

- Kalsiyum (HDS iyonu) dengesi;

- Beslenme, - Kalsiyum, - Vitamin D, - Parathormon,  
- Kalsitonin gibi faktörden etkilenir.

- Kalsiyum noksanlığında 10-20 mg kalsiyum/kg c.a. dozlarda Dİ infüzyonla verilir (%10, 20, 33 ve 50'li glukonat çözeltileri şeklinde).

- Ağızdan kalsiyum klorür, kalsiyum fosfatlı yem katkı maddeleri ile yalama taşları da verilebilir.

# Kalsiyum dengesi bozuklukları ve sađaltımı

- Doğum öncesinde 3-8 gün süreyle ağızdan günde 20-30 milyon ünite (500-750 mg) vitamin D verilmesi ile süt humması engellenebilir.
  - Bu amaçla doğumdan 2-8 gün önce 0.35-0.5 mg/hayvan miktarda etkin vitamin D de (1,25-dihidroksi vitamin D) verilebilir.

# Magnezyum dengesi bozuklukları ve sađaltımı

- HİS'da bulunan ikinci önemli iyondur.
- Magnezyum, bazı enzimlerin etkinliđi, sinirsel iletim, kasların uyarılabilirliğinde önemli rol oynar.
- İdrarla atılmasının arttığı durumlarda, böbrek hastalıklarında, sürgün ve aldosteron salgılanmasının arttığı durumlarda magnezyum kaybı hızlanır.
- Bu durum genellikle kalsiyum ve potasyum kaybı ile birlikte görülür.

# Magnezyum dengesi bozuklukları ve sađaltımı

- Magnezyum kaybı hallerinde, anılan iyonları da içeren çözeltiler kullanılır.

Sığırlarda %20-50'lik magnezyum sülfat çözeltilerinden önce DA yolla 200 ml miktarda verilir; takiben Dİ yolla 100-250 g kalsiyum ve magnezyum boroglukonat karışımı (%23'lük 500 ml magnezyum boroglukonata %6 oranında magnezyum klorür katılmış) yavaş enjeksiyonla verilir.

# Asidoz ve sađaltımı

- Hidrojen iyonlarının fazla üretilmesi ve birikmesi sonucu kan ve idrarın pH'sı düşer, serumda bikarbonat seviyesi genellikle 20 mEq/L'nin altına iner. Klor iyonu ve keton cisimleri bikarbonatın yerini alır.
- Vücutta düşmüş olan bikarbonat miktarını normale çıkarmanın en iyi ve kolay yolu dışarıdan sodyum bikarbonat veya bikarbonata çevrilebilen maddeler (1/6 molar sodyum laktat çözeltisi, laktatlı ringer çözeltisi gibi) ile bazı alkali maddeleri (sodyum sitrat gibi) vermektir.



# Asidoz ve sađaltımı

- Laktat iyonu (bikarbonat ön-maddesidir) karaciđerde asetik asit üzerinden karbonik asite, böylece bikarbonata dönüşür.
  - Vücutta laktik asit birikmesine bađlı durumlar ve karaciđer yetmezliđi hallerinde bikarbonat kullanılmalıdır.

# Asidoz ve sađaltımı

- Őiddetli asidoz hallerinde bikarbonat seviyesi 10-15 mEq/L'ye kadar iner. Hayvanlarda normal deđerleri 20-30 mEq/L arasındadır.

- Kabul edelim ki hayvanda 10 mEq/L bikarbonat ađıđı bulunsun. (HDS oranı canlı ađırlıđın %20'si kadardır)

Hayvanın canlı ađırlıđı dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan mEq bikarbonat miktarı HDS hacmi ile çarpılarak bulunur.

- Örgđ 30 kg c.a. bir koyun ve 400 kg c.a. siđıra verilmesi gereken bikarbonat miktarı:

- $30 \text{ kg c.a.} \times 10 \text{ mEq/L} \times 0.20 = 60 \text{ mEq}$

- $400 \text{ kg c.a.} \times 10 \text{ mEq/L} \times 0.20 = 800 \text{ mEq}$

# Asidoz ve sađaltımı

Ameliyat, anestezi, Őok gibi durumlarla oluŐan ciddi asidoz hallerinde bikarbonat ykleme dozunda verilmesi gerekir; bunun iŐin 1 mEq/ml (84 g sodyum bikarbonat/L) bikarbonat Őzeltisinden 10 ml/dk hızda (veya genellikle 15 dk arayla 2.2 mEq/kg c.a.) uygulanır.

- Solunumla ilgili asidoz hallerinde ncelikle solunum dzeltilmelidir; buna rađmen geŐmeyen olaylarda bikarbonat verilmelidir.

# Alkaloz ve sađaltımı

- Metabolik alkaloz HDS'da hidrojen iyonlarının azalması, bikarbonatın artmasıyla kendisini gösterir.
  - Klor ve potasyum yoğunluđu da düşer; sodyum miktarı ise deđişkenlik gösterir.
  - Alkalozda fizyolojik tuzlu su, amonyum klorür ve ringer çözeltisi kullanılır.
  - Arginin, lizin gibi amino asitlerden de yararlanır.

# Kullanılacak sıvı miktarları

- Sıvı kayıplarında kullanılacak sıvı miktarı normal su ihtiyacına göre hesaplanır.
- Normalde vücudun su ihtiyacı; Erginlerde 65 ml/kg, genç ve sağılanlarda 130 ml/kg olarak hesaplanır. Buna göre;
- 20 kg ağırlığındaki ergin köpeğin su ihtiyacı 1.3 L, 300 kg atın ihtiyacı da 19.5 L'dir.
- İşte, çeşitli şekillerde kaybolan su miktarı bu değerlere eklenir.

Vücuttan su kaybının derecesi derinin esnekliđi ile tespit edilebilir.

- **Hafif dereceli kayıp** (vücut ađırlıđının %4'ü kadar): Kusma, sürgün sırasında görülebilir. Deri hafif köseleşmiş, susama vardır ve mukoz zarlar nemlidir. Bu belirtilere göre, vücuda girmesi gereken suya ilaveten, vücut ađırlıđının %4'ü kadar daha sıvı verilmesi gerekecektir.

- **Orta dereceli kayıp** (%6 kayıp): Deri köseleşmiştir; deri çekildiği. Zaman pik yapar ve yavaş bir şekilde (2-4 sn) normale döner. Kıllar donuk, mukoz zarlar kuru, göz yuvarlağı yumuşak ve basıktır. Normal su ihtiyacına ilaveten, vücut ağırlığının %6'sı kadar sıvı verilmelidir.
- **Şiddetli derecede kayıp** (%8 kayıp): Derinin esnekliği kaybolmuştur; çekildiği zaman pik yapar ve 5-10 sn o halde kalır. Mukoz zarlar ve dil kuru, göz yuvarlağı yumuşak ve basıklaşmıştır. Bu durumda, normal su ihtiyacına ilaveten, hayvana vücut ağırlığının %8'i oranında sıvı verilmelidir.

- Vücuttan su kaybının %12 olması kalp yetmezliğine, %15 olması da dolaşım şokuna yol açabilir.
- Sağaltım esnasında vücuttan su kaybı devam ediyorsa, bunun miktarı da dikkate alınarak günlük ihtiyaç ve eksilip tamamlanması gereken sıvı da dikkate alınmalıdır.
- Şiddetli derecede sıvı kaybına uğrayan 300 kg ağırlığındaki bir süt ineğinin günlük su ihtiyacı şu şekildedir.
  - İdame için:  $130 \text{ ml} \times 300 \text{ kg} = 39 \text{ L}$
  - İkame için:  $300 \times \%8 = 24 \text{ L}$
  - Toplam:  $39 + 24 = 63 \text{ L}$



# Plazma hacminin düzeltilmesi- tamamlanmasında kullanılan maddeler

- Bu grupta dekstran, polijelin (jelatin, haemaccel) ve hidroksietil nişasta (hetastarch) gibi modifiye polisakkaridler bulunur.
- Veteriner hekimlikte daha çok dekstran ve polijelin (jelatin) kullanılır.

# Dekstran

*Leuconostoc mesenteroides* tarafından sakkarozun fermantasyonuyla elde edilen kompleks bir polisakkarittir.

- Sağaltımda dekstran 70-75 (makrodeks), dekstran 40 (Rheomakrodeks) şeklinde kullanılır.

§ Dekstran 70-75'in molekül ağırlıkları 70.000-75.000, dekstran 40'ın ise 40.000'dir.

- Çözeltileri belli bir süre beklemekle çökebilir; bu yüzden, kullanılırken buna dikkat etmek gerekir; çökmüş ise ılık suda çözdürülebilir.

## Farmakokinetik

- Dekstranlar molekül ağırlıklarına göre dolaşımda kalırlar.
  - Dekstran 70-75 dolaşımda 12 saat süreyle kalırken, dekstran 40 yaklaşık 2 saat kalır.
- Tüm dekstranlar dolaşımda bulunan *amilaz* tarafından molekül ağırlığı düşük dekstran kısımlarına ayrıştırılarak, böbrekle atılması hızlanır.
- Uygulamasını takiben ilk 24 saat içinde böbrekle %50'si atılır.
- Geriye kalan kısmı ise kapillar duvarı çok yavaş geçer ve birkaç hafta içinde okside edilir.

## **Etkileri**

- Dekstranlar, oligemiyi düzeltir, kalbin dolum basıncını artırır, kanın onkotik basıncını yükseltirler.
- Tromboz ve trombo-embolizmi önler.

## **İstenmeyen etkileri**

- Dekstranlar alerjiktir; deri döküntüleri, pruritis, urtikaria, eklem ağrısı, kan basıncının düşmesi, solunum güçlüğü, göğüste sıkışma ve ölüme neden olabilir.
- Pıhtılaşmayı ve kanama süresini uzatırlar. Bu etkileri uygulamasını takiben 6-9 saat sonra ortaya çıkar. Alyuvarların bir araya toplanmasını artırdıklarından, kan grubu tayinini bozarlar.

## **Uyarılar**

- Dekstranlar konjestif kalp yetmezliđi, ağır kanama veya pıhtılaşma bozukluđu, böbrek yetmezliđi, hipervolemi ve allerjisi bulunanlarda kullanılmamalıdır.
- Karaciđer yetersizliđinde dikkatli kullanılmalıdır.

## **Kullanılması**

- Dekstranlar plazma ve kan kayıplarına bađlı olarak ortaya çıkan dolaşım yetmezliđi ve şokun sađaltımında kullanılır.
- Dekstranlar fizyolojik tuzlu su veya %5'lik glikoz çözeltisi içinde %6'lık (Dekstran 70-75) çözeltisi hazırlanarak Dİ yolla infüzyon şeklinde kullanılır.

# Polijelin (Jelatin, haemaccel)

- Elektrolit çözelti (145 mM Na, 511 mM K, 6.26 mM Ca ve 145 mM Cl/L) içinde %3.5'lük çözeltisi halinde pazarlanır.
  - Osmotik ve onkotik basıncı plazmaninkine yakındır. İdrarla çabuk atılır.
  - Böbrek hastalığı bulunanlarda kullanılması tavsiye edilmez.
  - Antijenik bir maddedir ve bazı hayvanlarda kullanımını takiben küçük dereceli allerjik tipi tepkimelere neden olur.
  - Plazma hacmini artırmak için Dİ yolla infüzyon şeklinde hipovoleminin sağaltımında kullanılır.