

13. Hafta Sert çekirdekli meyve bahçelerinde Sert çekirdekli (erik, şeftali, kayısı vb) meyve bahçelerinde zararlı Akarlar Yaprak Bitleri ve Coleoptera Türleri

FAMİLYA : *Eriophyiidae*

- *Eriophyes padi*
- *E.(Acalitus) phloecoptes*
- *E. Similis*
- *E.tristriatus*
- *E.tristriatu var. erineus*
- *E.amygdali*
- *E.armeniacus*
- *E.insidosus*
- *Aculus fockeui*
- *Phytoptus avellana*

FAMILYA:*Aphididae*

- *Hyalopterus pruni*
- *Myzus persicae*
- *Brachycaudus persicia*
 - *B. helichrysi*

FAMILYA:*Coccidae*

- *Sphaerolecanium prunastri*
- *Paleolacanium bituberculatum*
- *Parthenolechanium corni*

TAKIM:COLEOPTERA

- FAMILYA:*Scarabaeidae*

- *Polyphyllo fullo*

- *Tropinota hirta*

FAMILYA:*Buprestidae*

- *Capnodis tenebrionis*

- *Capnodis* spp.

FAMİLYA:*Curculionidae*

- *Rhynchites baccus*
- *R. auratus*

FAMİLYA:*Curculionidae* *Rhynchites baccus*

- Ergin 5-7 mm uzunluğunda kıvılcık kahve ve bakır renkli ve metalik görünümlü.
- Antenler dirsekli ve ucu topuzlu , baş öne doğru uzamış
- Erginler ilkbaharda genç tomucuk ve yaprakları kemirir.
- Yumurtalarını meyve içine koyarlar, yumurta koymadan evvela meyveyi delik deşik eder.
- Yumurtanın gelişme süresi: 5-9 gündür.
- Olgunlaşan larva meyveyi terk eder. Toprakda pupa olur.
- Senede bir döl verir.
- Kışı ergin olarak geçirir.