

**HAL FONKSİYONLARININ HAL DEĞİŞKENLERİNE BAĞLILIĞI:
TERMODİNAMİK DENKLEMLER (KAPALI SİSTEMLER İÇİN)**

$$\Delta U = q + W, dU = \delta q_{tr} + \delta W_{mak} = TdS - PdV \dots\dots\dots 1$$

$$H = U + PV, dH = dU + PdV + VdP = TdS - PdV + PdV + VdP = TdS + VdP \dots\dots\dots 2$$

$$A = U - TS, dA = dU - TdS - SdT = TdS - PdV - TdS - SdT = -PdV - SdT \dots\dots\dots 3$$

$$G = H - TS, dG = dH - TdS - SdT = TdS + VdP - TdS - SdT = VdP - SdT \dots\dots\dots 4$$

Eşitliklerden

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T, \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -P$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P = T, \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S = V$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V = -S, \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -P$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S, \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = V$$

$$dU = TdS - PdV \Rightarrow U = f(S, V), dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \dots\dots\dots 1$$

$$dH = TdS + VdP \Rightarrow H = f(S, P), dH = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P dS + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S dP$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P \dots\dots\dots 2$$

$$dA = -SdT - PdV \Rightarrow A = f(T, V), dA = \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T dV$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \dots\dots\dots 3$$

$$dG = -SdT + VdP \Rightarrow G = f(T, P), dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T dP$$

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \dots\dots\dots 4$$

1, 2, 3 ve 4 Maxwell denklemleri

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = ?$$

$$G = H - TS, H = G + TS$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

İdeal gazlar için

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T &= V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \\ &= V - T \frac{R}{P} = 0 \end{aligned}$$

V

$$PV = RT$$

$$\frac{V}{T} = \frac{R}{P}$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{R}{P}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = ?$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = ?$$

$$\left[\frac{\partial(A/T)}{\partial T}\right]_V = ?$$

Kimyasal Potansiyel: Molar Serbest Entalpi (μ) (G)

Molar serbest entalpi fonksiyonuna kimyasal potansiyel denir.

$$\mu \equiv G \equiv \frac{g}{n}, \quad G = f(P, T),$$

$$dG = -SdT + VdP$$

$$\mu = f(T, P)$$

(1 atm'de saf ideal gaz için) μ^0 : standart kimyasal potansiyel
 P^0 : standart basınç, 1 atm, 1 bar

$$\mu = \mu^0 + RT \ln \frac{P}{P^0} \quad \text{saf gazın kimyasal potansiyeli}$$

$$\text{Gaz Karışımlarında } \mu_i(T, P_i) = \mu_i^0(T) + RT \ln \left(\frac{P_i}{P^0}\right), \quad P_i = P y_i$$

$$\mu_i(T, P, y_i) = \mu_i^*(T, P) + RT \ln y_i$$

Sıvı karışımlarda

$$\mu_i = \mu_i^* + RT \ln X_i$$