


Gebelik

Gebelik süresi

- Ortalama 63 gün
- 58-68 gün

Hormon

- Progesteron
- Gebelik CL'a bağımlı
- Plasental relaksin
- Progesteron azalması - doğum



(adapted from Steinetz, et al. 1989)

Abdominal palpasyon

USG

Hormon analizi

Yalancı Gebelik

- ▶ Fantom gebeliđi veya yalancı cysis
- ▶ Yalancı gebelik yaygın ve normaldir
- ▶ Yüksek plazma prolaktin konsantrasyonu sebep olur
- ▶ Klinik bulguları; süt yapımı ve laktasyon, anorexia (kilo kaybı yok), titreme, evi terk etmeyi istememe, bir bölgeye sahiplenme, yuvalanma, annelik objeleri
- ▶ Östrüstan 4-6 hafta sonra meydana gelir. Fakat bazı dişilerde herhangi bir zamandada şekillenebilir
- ▶ Pro-östrus/östrus yılda bir defa şekillendiđi zamanlarda dişilerin diđer yavruları beslemesi için eski bir mekanizmayı anlatır.
- ▶ Genellikle 10-30 günde kendiliđinden geriler
- ▶ Eđer sahipler klinik deđişiklerle uğraşamaz veya mastitis şekillenirse tedaviye ihtiyaç duyulur
- ▶ Her östrüstan sonra genellikle yalancı gebelik sadece bir kez görülür. Fakat hormonal terapi uygulandıđı zaman devreler halinde tekrarlayabilir