

Cyprinodontidae türleri, anavatanları, özellikleri, cinsiyet ayrımları, bakımı, sosyal davranışı, üretimi, beslenmesi.

- **CYPRINODONTIDAE FAMILYASI (Yumurta bırakan dişli sazanlar)**
- Tür bakımından zengindirler.
- Tropikal ve subtropikal bölgelerde çok yaygındır. Yalnızca Avusturalya'da raslanmaz.
- Küçük ve orta boyda çok güzel renkli balıklardır.
- Cyprinodontidae familyasının en karakteristik özelliği;
- Ağızlarında dişlerinin bulunması,
- Yumurta bırakmaları
- Bıyıklarının bulunmamasıdır.

- Özellikle *Aphysemion* türleri yalnızca sürüler halinde bulunurlar.
- Diğer türlerin küçük toplulukları birbirlerini yiyeceklerinden, türler ayrı akvaryumlarda tutulmalıdır.
- Erkekler, aralarında iyi geçinmesine rağmen, dişilere karşı oldukça saldırgandırlar. Bunun için yoğun bitkili akvaryumlarda her erkek balığa küçük bir harem kurulmalıdır.
- Akvaryum içinde dişilerin saklanabileceği yerler bulunmalıdır. Aksi taktirde dişiler, erkekler tarafından öldürülebilir.

- Akvaryumda genel olarak suyun üst tabakalarını tercih ederler.
- *Aphyosemia*
- *Panchax*
- *Epiplatys*
- *Nothobranchius*
- ***Aphyosemion australe***
- **Coğrafik Kökeni:** Angola, Kamerun, Kongo
- **Beslenme Biçimi:** Etçil. Canlı yemleri tercih ederler, hatta kuru ve dondurulmuş yemlere alışmayabilirler.
- **Davranış Biçimi:** Barışçıl, uyumlu bir karma akvaryum balığıdır.
- **Kendi Türlerine Davranışı:** Barışçıl.
- **Yüzme Seviyesi:** Orta - Yüzey

- **Üreme:** Erkekler dişilerden daha uzun kuyruklu, renkli ve uzun yüzgeçli olur. Üremeleri diğer türlerden daha kolaydır. 10 litrelik torf ile zenginleştirilmiş bir üreme tankı yeterlidir. Bitkilerin üzerine yumurtlarlar, bu yüzden akvaryumda bitki olmalı, Yavruların iyi gelişmesi için artemia ve/veya mikro kurt ile beslenmeli ve sık su değişimi yapılmalıdır. Yumurtalar en fazla 3 hafta süre içerisinde çıkar bu süre diğer türlere göre oldukça az bir süredir.

- **Sıcaklık:** 21°C - 24°C
- **Su Sertliği:** Yumuşak - Orta
- **pH:** 6.0 - 7.0

- **Latince Adı:** *Pachypanchax playfairii*
- **Coğrafik Kökeni:** Madagaskar, Seyşeller ve Zanzibar adasında, Tanzanya.
- **Yaşam Alanı:** Küçük dereler ve göletlerde yaşar. Tatlı ve acı su sistemleri.
- **Beslenme Biçimi:** Doğada solucanlar, kabuklular, böcekler ve balıklarla beslenir. Akvaryum ortamında kaliteli pul yemleri kabul edecek olsa da su piresi veya kan kurdu gibi canlı ve dondurulmuş yemler de diyetlerinden eksik edilmemelidir.
- **Davranış Biçimi:** Ağızına sığabilecek balıklara karşı agresif.
- **Cinsiyet Ayrımı:** Erkekler dişilere göre daha renklidir.

- **Üreme:** Zor değildir, Yumurtlama tankında su yumuşak, hafif asidik, pH 6.5 - 7.5, sıcaklık 23 - 26°C değerlerinde olmalıdır. Yumurtlama tankında loş bir ortam yaratmak için su üstü bitkileri kullanılabilir. Yumurtaları bırakmaları için ince yapraklı bitkiler veya naylon yumurtlama paspası eklenmelidir. Ayrıca torf filtrasyon faydalı olacaktır. 1 erkek ve 2 dişiden oluşan bir üçlü seçilir ve yumurtlama tankına alınmadan önce canlı yem ile kondüsyon kazandırılmalıdır. Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 12 gün içinde çıkarlar. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra artemia veya mikro kurt verilebilir.
- **Su Sertliği:** 5 - 20 °dH (Yumuşak - Sert)

- ***Epiplatys dageti***
- Afrika: Monrovia, Liberya, güneybatı Gana'ya kadar güney Fildişi Sahili üzerinde.
- **Coğrafik Kökeni:** Gana
- **Beslenme Biçimi:** Hem etçil, hem otçul
- **Davranış Biçimi:** Barışçıl, uyumlu bir karma akvaryum balığıdır.
- **Üreme:** Dişiler daha küçük ve daha renksiz olurlar.
- **Sıcaklık:** 21°C - 23°C üretimde 24°C
- **Su Sertliği:** 5 - 12 °dH
- **pH:** 6.0 - 7.0 üretimde 6.5