

Sıvı-Elektrolit ve Asit Baz Denge Farmakolojisi

Prof.Dr. Ender Yarsan

A.Ü.Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

- ❖ Normal hidrasyon dengesi
 - İçecek ve yiyecekler; oksidasyon sonucu oluşan su
 - Zorunlu su kaybı (idrar, dışkı, ter)
 - Su turnoveri
- ❖ Hipotalamusun alt, orta ve ön bölgelerindeki susama ve su içme merkezleri
- ❖ Evcil hayvanlarda su turnoveri 65-132 ml/kg/gün
- ❖ Su oranı
 - Erişkinlerde vücut ağırlığının %55-60'ı
 - Genç hayvanlarda %70-75'i
 - Besili hayvanlarda %50'si
- ❖ Ekivalan kavramı
 - Elektrolitler ağırlıklarından ziyade iyonik değerlilikle
 - *Ekivalan değeri = atom-mol.ağırlığı / iyonik değer*
 - Vücut sıvılarında miliekivalan ile (mEq)
- ❖ Osmolarite ve osmosis
 - Sıvı-elektrolit denge bozukluğu ve hemostazis için
 - Sıvı kesimleri yarı-geçirgen zarla ayrılmış
 - İzotonik çözelti = 300 mOsm
 - Hipertonik >300 mOsm
 - Hipotonik <300 mOsm

❖ İzotonik çözelti

- g/l = molekül ağırlığıx300/1000xiyon sayısı
 - ◆ Glukoz için; $180 \times 300 / 1000 \times 1 = 54$ g/l (%5)
 - ◆ NaCl için; $58.5 \times 300 / 1000 \times 2 = 8.7$ g/l (%0.9)

❖ Sıvı elektrolit sağaltımında genel ilkeler

- Sıvı sağaltımına ne zaman başlanmalı?
- Hangi çözeltiler kullanılmalı ?
- Ne kadar verilmeli ?
- Çözelti hangi hızda verilmeli ?
- Hangi yolla verilmeli ?
- Sağaltımın etkinliğini nasıl değerlendirmeli ?

❖ Sağaltımın amacı

- Dehidratasyon, hiperhidratasyon ve elektrolit dengesinin düzeltilmesi
- Çeşitli sebeplerle atılan sıvı-elektrolitlerin takviyesi

Sodyum dengesi bozuklukları

Dehidratasyon

- Su kaybının su alımından fazla olması durumu
 - ❖ İzotonik dehidratasyon
 - ❖ Hipertonik dehidratasyon
 - ❖ Hipotonik dehidratasyon (Hiponatremi)

Hiperhidratasyon

- ADH salınımı, kalp, böbrek, karaciğer bozuklukları

Kullanılacak sıvılar

Hipernatremi durumunda

(Dehidretasyonlu/Dehidratasyonsuz)

❖ Dehidratasyonun belirlenmesi

- Eksilen sıvı (L) = $(1 - 140 / \text{serum Na, mEq/L}) \times \text{vücut ağırlığı (kg)} \times 0.6$

❖ Na düzeyi yanıtıcı olabilir

Dehidratasyon sađaltımı

- ❖ NaCl çözeltilisi (%0.9) – serum fizyolojik
 - 154 mEq Na ve 154 mEq Cl
- ❖ Dekstroz çözeltilisi (%5'lik)
- ❖ NaCl çözeltilisi (%3 yada 5'lik)
- ❖ Dengeli çözeltiler
 - Ringer çözü., Laktatlı ringer, İsolYTE çözü.

Hiperhidratasyon durumu

- Su kısıtlaması
- MSS belirtileri varsa; %5'lik NaCl Di yolla

Potasyum dengesi bozuklukları

Potasyum eksikliği (hipokalemi)

- K – HiS'da yüksek miktarda
- Asidoz – hiperkalemi
- Alkaloz – hipokalemi
- Rasyonda K eksikliği ve şiddetli ishal

Potasyum fazlalığı Hiperkalemi

Hipokalemi sađaltımı

- Verilme hızı çok önemli
- Hızlı uygulama geçici/tehlikeli hiperkalemiye
- 1 mEq/3 dakika
- Kullanılan sıvılar
 - ◆Potasyum klorür çözeltilisi
 - ◆Potasyum fosfat
 - ◆Potasyum asetat
 - ◆Darrow çözeltilisi
- Özellikle ishal olaylarında

- ❖ Hiperkaleminin sađaltımı
 - Hipertonik glikoz çözü. + insülin
 - ◆%20'lik çözeltisi Dİ yolla yavaş uygulanır
 - Sodyum bikarbonat çözeltisi
 - Kalsiyum sülfat çözeltisi
 - Sodyum polistiren sülfonat

Kalsiyum dengesi bozuklukları

Hipokalsemi

- Normal kan Ca düzeyi; 8.5–10.5 mg/100 ml

Hiperkalsemi

- Ca - 12 mg/100 ml'nin üstüne çıkar

❖ Hipokalseminin sađaltımı

- Kalsiyum glukonat,
 - ◆Ağızdan, Kİ ya da Dİ yolla
- Kalsiyum klorür
- Kalsiyum fosfat

❖ Hiperkalsemi sađaltımı

- Furosemid + sıvı
- Glukokortikoidler
- Na₂-EDTA

Magnezyum dengesi bozuklukları

Hipomagnezemi

Hipermagnezemi

❖ Hipomagnezeminin sađaltımı

- Parenteral Mg sülfat (DA, Kİ, Dİ)
 - ◆%10–50'lik DA, Kİ, Dİ
- Mg sülfat çarpınma önleyici

❖ Hipermagnezeminin sađaltımı

- Furosemid ile zorunlu işetme
- Ca tuzları; yavaş Dİ yolla

- ❖ Kullanılacak sıvı miktarları
 - Normal su turnoveri + eksilen sıvı
 - Normal su turnoveri;
 - ◆ Erişkinlerde 65 ml/kg/gün
 - ◆ Sağılan ve gençlerde 130 ml/kg/gün
 - ◆ 20 kg ergin köpek: 1300 ml
 - ◆ 450 kg at: 29 L

- ❖ Hafif dereceli su kaybında
 - ◆ % 4 su kaybı
 - ◆ Dehidratasyon belirtisi yok, kusma ve ishal var
 - ◆ Deri hafif elastikiyetini kaybetmiş
 - ◆ Vücut ağırlığının % 4 oranında sıvı ilave edilir
 - 20 kg köpek : 800 ml su

- ❖ Orta dereceli su kaybı
 - %6 su kaybı
 - Deri çekilince pik yapar, kıllar parlaklığını kaybetmiş
 - Mukozalar kuru, deri köseleşmiş
 - Vücut ağırlığının %6'sı sıvı ilavesi
 - ◆ 20 kg köpek : 1.2 L su

- ❖ Şiddetli su kaybı
 - %8 su kaybı
 - Deri elastikiyet ve esnekliğini tamamen kaybetmiş
 - Mukoz zarlar kuru, göz yuvarlağı çökmüş
 - Vücut ağırlığının %8'i sıvı ilavesi yapılır
 - ◆ 20 kg köpek: 1.6 L su
 - Dolaşım kollapsında %12 su ilavesi
 - Akut şok olgusunda %15 sıvı ilavesi yapılır

- ❖ Verilme hızı
 - Önce hızlı sonra yavaş verilmeli
 - Uygun hız 15 ml/kg/saat

❖ Verilme yolu

- Çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur;
 - ◆ Hastalığın şiddeti/tipi
 - ◆ Dehidratasyonun derecesi, hastanın durumu,
 - ◆ Zaman ve mevcut ekipman
- Ağızdan ve düz bağırsak yoluyla
- En çok uygulanan yol parenteral yol (Dİ uygulama)
- Deri altı uygulama – hipodermokliz

Asit-Baz dengesi bozuklukları

- Vücut hücrelerinin normal görevleri için pH aralığı
- pH – akciğer ve böbrekler ile
- H etkinliği ile + pH arasında ilişki
 - ◆ H alanlar bazik ; H verenler asidik

❖ Tampon sistemler

- HDS, HİS ve kemikte
- 5 tampon sistemi bulunur
 1. İntrinsik sistem
 2. Erken hücrel sistem
 3. Solunum sistemi
 4. Böbrek sistemi
 5. Geç hücrel sistem

❖ Asidoz / Alkaloz

- Arteriyel kan pH'sının 7.35'in altına inmesi asidoz
- Arteriyel kan pH'sının 7.45'in üstüne çıkması alkaloz
- 6.8'in altı- 7.8'in üstü tehlikeli
- Asidoz;
 - ◆ Solunum asidozu
 - ◆ Metabolik asidoz
 - ◆ Böbrek asidozu
- Alkaloz
 - ◆ Solunum alkalozu
 - ◆ Metabolik alkaloz

❖ Asidozun sađaltımı

- Sodyum bikarbonat çözeltisi; %1.3'lük
 - ◆Plazma HCO₃ düzeyinin 15 mEq/L'ye çıkarılması
 - ◆HCO₃ çözeltisiyle çok çabuk düzeltilme yapılması uygun olmaz
- İzotonik sodyum laktat çözeltisi
 - ◆laktat – asetik asit – CO₂ – HCO₃
- Hipertonik sodyum laktat çözeltisi
- Sodyum sitrat ve disodyum hidrojen sitrat
- Laktatlı ringer

❖ Alkalozun sađaltımı

- Klor, kan ve kan sıvısı kaybına bađlı alkalozda;
 - ◆Dİ yolla fizyolojik tuzlu su
- İzotonik amonyum klorür çözeltisi
- Arginin hidroklorür
- Hidroklorik asit çözeltisi

Plazma hacmini genişleten maddeler ve kan nakli

- Toplam kan hacminin %20 yada daha fazla azalması
- Sentetik–büyük moleküllu maddeler
 - ◆Dekstanlar, polijelin, nişasta, jelatin
- Şok olayı

Kan ve plazma ürünleri

- ❖ Tam kan ve plazma
- ❖ Yıkanmış alyuvar
- ❖ Plazma proteini çözeltisi
- ❖ Normal insan serum albümini
- ❖ Steril plazma albümini (insan)

Plazma yerini tutan maddeler

Dekstran

- Dekstran 70–75 (makrodeks)
- Dekstran 40 (Rheomakrodeks)

- Dolaşımda uzun süre kalır (MA ile orantılı olarak)
- Alerjik etki oluşturabilirler
- Dolaşım yetmezliği ve şok sağaltımında
 - ◆ Köpeklerde 4–40 ml/kg/gün

Polijelin

Hidroksietil nişasta

Parenteral besleme

Peritoneal diyaliz

Erişkinlerde fizyolojik ve bazı patolojik durumlarda sıvı–elektrolit kaybı

Kaybolma şekli	Elektrolit bileşimi	Hacmi/24 sa
İdrar	Değişkendir, ortalama kayıp; Na 75-170 mEq/L K 40-60 mEq Cl 115-14 mEq	1000-1500 ml
Ter	Bileşimi: Na 50 mEq/L K 7 mEq/L Cl 40 mEq/L	Fazla değişkendir
Buharlaşıma		9-12 ml/kg; erişkinde 650-850 ml (ateş yükseldikçe her bir fazla derece için 50-75 ml artar)
İshal	Dışkı içinde kayıp; Na 50-100 mEq/L K 20-40 mEq/L Cl 40-80 mEq/L	Çıkarılan dışkının hacmi ölçülerek
Kusma	Na 20-116 mEq/L (pH'ya bağlı olarak değişir) K 5-32 mEq/L Cl 50-154 mEq/L	Çıkarılan mide suyu ölçülerek