

Sheep and Goat Brucellosis

Koyun ve Keçi Brusellozu

Dr. Research Assistant Bülent BAŞ

- When a brucellosis disease is detected in the sheep and goats according to the laboratory report, the veterinarian may issue a disease exit report. The animal health police commission takes the decision to exit the disease and announce it.
- a) Abortion animals are separated from the intact. It is allowed to consume milk after boiling
- Koyun ve keçilerde laboratuvar raporuna istinaden bruselloz hastalığı tespit edildiğinde veteriner hekim hastalık çıkış raporu düzenler. Hayvan sağlık zabıtası komisyonu hastalık çıkış kararı alır ve ilan eder.
- a) Yavru atan hayvanlar sağlamlardan ayrılır. Hastalık çıkan sürünün sütlerinin kaynatıldıktan sonra tüketimine izin verilir.

- **b)** To prevent contamination of the disease, waste baby membranes are burned and destroyed. Disinfection is carried out in barns and pens.

- **b)** Hastalığın sađlamalara bulaşmasını önlemek için atık yavru zarları yakılıp imha edilir. Ahır ve ağıllarda dezenfeksiyon yapılır.

- c) In case of disease-free sheep and goats with the possibility of infection, vaccination is performed by paying attention to the conditions specified in the package insert. Vaccinated animals are marked.

- c) Hastalık bulaşma ihtimali olan hastaliksız koyun ve keçilere, prospektüsünde yazılı şartlara dikkat edilerek, aşı yapılır. Aşı yapılan hayvanlar işaretlenir.

- d) It is prohibited to enter double-caged animals into the quarantined diseased area.

- d) Karantinaya alınan hastalıklı bölgeye çift tırnaklı hayvanların girmesi yasaklanır.

- e) Sheep and goats to fight against brucellosis disease according to the programs and projects to be prepared by the Ministry of sheep, goats, lambs and children are vaccinated. Lamb and capricorn vaccinations are continued in the following years.

- e) Koyun ve keçilerde bruselloz hastalığı ile mücadele etmek için Bakanlıkça hazırlanacak program ve projelere göre koyun, keçi, kuzu ve oğlaklara aşı uygulanır. Kuzu ve oğlak aşılamlarına ertesi yıllarda da devam edilir.

- f) The rams and monkeys in the herds of sheep and goats are removed and removed from the breeder.

- f) Bruselloz hastalığı çıkan koyun ve keçi sürülerindeki koç ve tekeler enenir ve damızlıktan çıkarılır.

- g) The quarantine measures taken due to the brucellosis disease in sheep and goats are limited to the site or place of the disease. After 30 days of disinfection, the quarantine measures are removed.

- g) Koyun ve keçilerde çıkan bruselloz hastalığı sebebiyle alınan karantina tedbirleri hastalık çıkan ağıl veya yerle sınırlıdır. Son yavru atmadan otuz gün sonra dezenfeksiyon yapılarak karantina tedbirleri kaldırılır.