



İpekböceği Yetiştirme

Prof. Dr. H. Vasfi Gençer

A. Ü. Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
Ankara

Bakım ve Besleme

- Dut yaprağı özellikleri
- Yaş dönemlerine göre bakım besleme
- Uyku dönemlerinde bakım

Dut Yaprađı

- 1 kutu ipekböceđi tohumundan yetiřtirilecek ipekböceđi için gerekli dut yaprađı miktarı

Yař	Yaprak (kg)
1.	1-2
2.	5-6
3.	20-25
4.	80-90
5.	450-475
Toplam	550-600

Alan Gereksinimi

- 1 kutu ipekböceği tohumundan yetiştirilecek ipekböceği için için gerekli alan

Yaş	Her Yaşın Başında (m ²)	Her Yaşın Sonunda (m ²)
1.	0.2	0.8
2.	1.00	2.0
3.	2.0	4.5
4.	5.0	10.5
5.	10.5	20.5

Larvaların Yaş Dönemi Çevre İstekleri

- İlk Yaşlar (1., 2., 3.)
- Son Yaşlar (4. ve 5.)

- Sıcaklık
- Nem
- Havalandırma
- Işık
- Yaprak kalitesi

Larva Dönemi Çevre Koşulları

Yaş	Sıcaklık (°C)	Nem (%)
1.	26-28	85
2.	26-28	85
3.	24-26	80
4.	22-24	75
5.	20-23	70



Besleme



- Bol yapraklı İchinosa dut çeşidi kapama bahçesi



- İlk yaşlardaki böcekler için yaprak kıyma

Besleme



- İnce kıyılmış ve bütün yapraklar ile genç ve son yaşlı larvaların beslenmesi



Küne Temizliđi

Küne; ölü böcekler, kurumuş artık yapraklar, deri artıkları ve dışkıdan oluşan ipekböceđi altlıđıdır. Organik özellikte olması nedeniyle fermente olmakta ve mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Her yaş içerisinde bir ya da daha çok kez temizlenmesi gerekir. Bu amaçla her yaş için farklı büyüklükte gözlerden oluşan temizleme ađları kullanılır. Böceklerin, üstlerine örtülen ađınn üzerine toplanmaları için besleme yapılır ve böylece böcekler altlıktan ayrılır.

Larvaların Uyku Dönemi Çevre İstekleri



Uyku Dönemi



- Sağlık koruma amaçlı toz kireç uygulaması uyku döneminde yapılır.