

ŞERBETÇİOTU ZARARLILARI (3)

Phorodon humuli

Hemiptera: Aphididae

Şerbetçiotu yaprakbiti şerbetçiotunun yapraklarının alt yüzünde, genç sürgün uçları, çiçek ve kozalarda emgi yapar ve bitkiler zayıflar. Ayrıca yaprak ve sürgünlerde kurumalara neden olabilmektedir. Fumajin oluşumu bitkinin fotosentez yapmasını da engellemektedir.

ANASON ZARARLILARI (3)

Anason Güvesi

Depressaria daucivorella

(Lepidoptera :Occophoridae)

Anason güvesi kışı döllenmiş dişi ergini olarak toprakta geçirir. Bırakılan yumurtalardan larvalar yaprak içine girerek parankima dokusu ile beslenirler. Zararı, larvalar meydana getirir. Larvalar, yaprak, çiçek ve tohumculukları yemek suretiyle zarar verirler. Ayrıca, yapraklarda küçük delikler açar, buradan iki epidermis arasına girerek parankima dokusunu yemek suretiyle galeriler oluştururlar.

Anasonda Yaprakbiti

Hyadaphis foeniculi

Aphis fabae

(Hemiptera :Aphididae)

İki yaprak biti türü de kışı yumurta halinde geçirmektedir. Bahar aylarında konukçu bitkinin yeni sürgün ve taze yapraklarda öz suyu emerek beslenirler. Genel olarak anason alanlarında çiçek tohumcuğu oluşmaya başladığı zaman ortaya çıkarlar. Döl sayıları 10'nun üzerindedir.