

SOYA ZARARLILARI (4)

Soyada Yeşilkurt (*Heliothis* sp.)

Ergin dişiler yumurtalarını yaprakların alt yüzüne bırakır. Bazende çiçek tablasına ve kapsüllere de yumurta bırakılabilir. Larvalar önce taze yapraklarda beslenirler. Fakat larvaların bu zarar şekli önemli değildir. Larvalar asıl önemi zararını çiçeklerle ve baklalarla beslenerek yaparlar. Özellikle son döneme yakın larvalar baklanın kabuğunu deler yeşil daneleri yiyerek zarar yapar.

Soyada Görülen diğer zararlılar arasında *Bemisia tabaci*, *Thrips tabaci*, *Tetranychus cinnabarinus* ve *Nezara viridula*' dır.

SUSAM ZARARLILARI (4)

Susam Güvesi

Antigastra catalaunalis

(Lepidoptera: Pyralidae)

Susam güvesi kışı toprakta veya yere düşmüş bitki artıkları arasında pupa döneminde geçirir. Dişi bireyler yumurtalarını susam yapraklarının alt yüzüne bırakır . Çıkış yapan zararlının larvaları yaprakları kıvrarak ve ağ örerek beslenmesine devam eder. Olgunlaşan larvalar toprağa iner ya da dökülmüş bitki artıkları arasında ve/veya topraktaki çatlaklar içinde pupa olurlar. Susam güvesi yılda 6 veya iklim şartlarına göre daha fazla sayıda döl verebilmektedir.

Susamda Yaprakbiti

Aphis gossypii

(Hemiptera: :Aphididae)

Yaprakbiti kışı yumurta döneminde geçirir. Yaprakbiti hem nimf hem de ergin devrede bitkinin gövde yaprak ve çiçek tomurcuklarından özsuyu emerek zarar yapar. Emilen yerlerde renk açılmaları olur. Ayrıca salgıladıkları tatlı maddeler nedeni ile zarar oranı artar.