



HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ

Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ

Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonları

- Hem acil servislerde hem de uzun dönem bakım servislerinde görülen en yaygın hastane enfeksiyonudur
- Tüm hastane kaynaklı enfeksiyonların yaklaşık %40'ını oluşturur ve nozokomiyal septiseminin ana kaynağıdır
- Bu enfeksiyonlar %80 kateterizasyon, %20 sistoskopi vb. ürolojik girişimler sonucu ortaya çıkar

Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonları

- Kateter ilişkili nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonlarından sorumlu olan mikroorganizmalar genellikle hastanın fekal florasından ya da hastane florasından kaynaklanmaktadır
- Sıklıkla karşılaşılan nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonu etkenleri:
 - *Escherichia coli*
 - *Candida* spp.
 - *Enterococcus* sp.
 - *Pseudomonas* spp.
 - Diğer: *Proteus mirabilis*, *Staphylococcus epidermidis*, *Acinetobacter* spp., *Citrobacter* spp.

Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonları

Öğrencilerin konu ile ilgili hazırladıkları sunumlar