

0.1 Alt Gruplar ve Yan Kümeler:

Tanım 1 (A, \circ) bir grup olmak üzere $B \subset A$ kümesi " \circ " işlemine göre bir grup oluşturuyorsa B ye A nın bir alt grubu denir.

1. Her grup kendisinin bir alt grubudur.
2. Tek başına, birim eleman yardımıyla her grubun bir alt grubu oluşturulabilir. Yani e , (A, \circ) grubunun bir elemanı ve $G = \{e\}$ olmak üzere (G, \circ) grubu (A, \circ) grubunun bir alt grubudur.

Örnek 2 Tamsayılar bilinen çıkarma işlemine göre reel sayıların bir alt grubudur.

Uyarı 3 (A, \circ) grubunun birim elemanı " e " olmak üzere bu grubun her alt grubunda birim elemanı " e " dir. Aksi taktirde alt grubun birim elemanı farklı ise bu birim elemanın teklifi ile çelişir. Aynı şekilde alt gruptan alınan bir elemanın tersi aynı zaman da grubun aynı elemanın tersi olmak zorundadır.

Bir grubun alt grubu bulunurken grup özellikleri gösterileceği gibi aşağıdaki Teorem yardımıyla daha kolay gösterilebilir.

Teorem 4 (A, \circ) grubu verildiği zaman A kümesinin bir alt kümesi olan B nin bir alt grup olması için gerek ve yeter şart

1. Her $a, b \in B$ için $a \circ b \in B$
 2. Her $a \in B$ için $a^{-1} \in B$
- özelliklerinin gerçekleşmesidir.

İspat: B , A nın bir alt grubu ise 1. ve 2. özelliklerinin sağlandığı açıktır.

Şimdi 1. ve 2. özellikleri sağlansın. Bu durumda 1. özellikten kapalılık sağlanır. 2. özellik ise ters elemanın varlığını garanti etmektedir. Yine 2. özellikten $a \circ a^{-1} = e$ olduğundan birim elemanın varlığını gösterir. Son olarak A kümesinden alınan her elemanı için \circ işleminin birleşme özelliği olduğundan $B \subset A$ olduğundan B kümesi üzerindedir birleşme özelliği sağlanır. O halde (B, \circ) bir gruptur.

Teorem 5 (A, \circ) grubunun iki alt grubu (B, \circ) ve (C, \circ) ise $B \cap C$, A grubunun \circ işlemine göre bir alt grubudur.

B , A grubunun \circ işlemi altında bir alt grubu olsun. $a, b \in A$ olmak üzere

$$a \sim b \Leftrightarrow b^{-1} \circ a \in B$$

olsun.

Teorem 6 \sim bağıntısı A kümesi üzerinde bir denklik bağıntısıdır.

İspat: i. $a \in A$ olsun. $a^{-1} \circ a = e \in B$ olduğundan $a \sim a$ yani simetri sağlanır.

ii. $a \sim b$ olsun. Bu durumda $b^{-1} \circ a \in B$ ve B bir grup olduğundan

$$(b^{-1} \circ a)^{-1} = a \circ b^{-1} \in B$$

olur. Bu durumda $b \sim a$ sağlanır. Yani simetri özelliği gerçekleşir.

iii. $a, b, c \in A$ olmak üzere $a \sim b$ ve $b \sim c$ sağlansın. Bu durumda

$$b^{-1} \circ a \in B \text{ ve } c^{-1} \circ b \in B$$

sağlanır. Buradan B, \circ işlemi altında bir grup olduğundan

$$\begin{aligned} (c^{-1} \circ b) \circ (b^{-1} \circ a) &= c^{-1} \circ (b \circ b^{-1}) \circ a \\ &= c^{-1} \circ e \circ a = c^{-1} \circ a \in B \end{aligned}$$

elde edilir. Bu ise $a \sim c$ olduğunu yani geçişme özelliğinin sağlandığını gösterir.

Dolayısıyla \sim bağıntısı A kümesi üzerinde bir denklik bağıntısıdır.

Tanım 7 x, A grubunun bir elemanı ve B, A 'nın bir alt grubu olmak üzere

$$x \circ B = \{x \circ b : b \in B\}$$

kümesine B kümesinin A kümesindeki Sol-Yan Kümesi denir.

Benzer olarak

$$B \circ x = \{b \circ x : b \in B\}$$

kümesine de B kümesinin A kümesindeki Sağ-Yan Kümesi denir.

Sağ ve Sol Yan kümeler genellikle birbirlerinden farklı kümelerdir. Fakat grup değişmeli ise

$$x \circ b = b \circ x$$

olacağından sağ ve sol yan kümeler aynı kümelerdir.

Teorem 8 $D(x) = \{y \in A : y \sim x\}$, \sim bağıntısının bir denklik sınıfı olsun. Bu durumda $D(x)$, A kümesinin bir sol yan kümesi yani

$$S(x) = x \circ B$$

dir.

İspat: $y \in D(x)$ olsun. Buna göre $y \sim x$ olup $x^{-1} \circ y \in B$ gerçekleşir. Bu durumda $x^{-1} \circ y = b$ olacak şekilde bir $b \in B$ vardır.

$$\begin{aligned} x \circ x^{-1} \circ y &= x \circ b \\ y &= x \circ b \end{aligned}$$

olduğundan $y \in x \circ B$ elde edilir. Böylece $D(x) \subset x \circ B$ bulunur.

Şimdi $y \in x \circ B$ olsun. O halde $y = x \circ b$ olacak şekilde bir $b \in B$ vardır. $x^{-1} \circ y = b$ olup $x^{-1} \circ y \in B$, yani $y \sim x$ sağlanır. Böylece $y \in D(x)$ olup $x \circ B \subset D(x)$ gerçekleşir. Sonuç olarak

$$S(x) = x \circ B$$

elde edilir.

Teorem 9 $a \in A$, $b_1, b_2 \in B$ ve $b_1 \neq b_2$ olmak üzere

$$a \circ b_1 \neq a \circ b_2$$

gerçeklenir.

Tanım 10 Bir sonlu grubun elemanlarının sayısına o grubun Basamağı denir.

Teorem 11 (LAGRANGE TEOREMİ) A , n . basamaktan bir sonlu grup ve B , A grubunun m . basamaktan bir alt grubu olsun. Bu durumda m, n sayısının bir bölenidir.

İspat: B nin k tane sol yan kümesinin olduğunu kabul edelim. Her yan kümenin tam m tane farklı elemanı vardır. Yan kümeler A kümesinin bir parçalanmasını oluşturduklarından bütün yan kümelerin birleşimi A kümesine eşittir. O halde $n = km$ olacak şekilde $k \in \mathbb{N}$ vardır.

0.2 Kuvvet Kuralı

Tanım 12 Bir elemanın kuvveti aşağıdaki şekilde tanımlanır.

1. $a^1 = a$
2. $n \in \mathbb{N}$ için a^n tanımlı ise $a^{n+1} = a \cdot a^n$ olur.

Burada tümevarım kuralları uygulanmaktadır. Bu tanımları tamsayılara genişletelim.

Tanım 13 $a^0 = e$ olarak ve $k \in \mathbb{N}$ olmak üzere a^{-k} büyüklüğünü ise $(a^{-1})^k$ olarak tanımlayalım.

Aşağıdaki teoremi ispatsız olarak vereceğiz.

Teorem 14 A bilinen çarpma işlemi altında bir grup ve $m, n \in \mathbb{Z}$, $a \in A$ olsun. Bu durumda aşağıdaki özellikler sağlanır.

1. $a^n a^m = a^{n+m}$,
2. $a^{-n} a^n = e$,
3. $(a^n)^m = a^{nm}$.

Teorem 15 (A, \circ) bir grup ve $a \in A$ olsun. G ise a^n ($n \in \mathbb{Z}$) şeklindeki, a nin bütün kuvvetlerinin kümesi olsun. Bu durumda (G, \circ) A nin bir Abelyen alt grubudur.

0.3 Devirli Gruplar

Tanım 16 A bir grup olsun. Eğer A grubunun her elemanı n tamsayısının özel bir değeri için a^n sayısına eşit olacak şekilde $a \in A$ sayısı varsa, A grubuna "a" tarafından üretilen Devirli Grup denir.

Her devirli grup bir deđiřmeli gruptur. Teorem (15) de oluřturulan (G, \circ) altgrubu A grubunun a tarafından üretilen devirli altgrubudur.

Grup iřlemi bilinen toplama iřlemi ise a^n yerine $n.a$ gösterimini kullancađız. Bu durumda $(\mathbb{Z}, +)$ 1 tarafından üretilen devirli bir gruptur.

Tanım 17 *A bir grup ve $x \in A$ olsun. x ile üretilen devirli grubun basamađına x elemanının basamađı denir.*

x in basamađı $x^k = e$ olacak řekildeki en küçük pozitif k sayıdır. Böyle bir k sayısı bulunamıyorsa x Sonsuz Basamaktadır denir.

Tanım 18 *A nın B altgrubunun farklı sol-yan kümelerinin sayısına B nin A grubundaki İndisi denir. İndis pozitif bir tamsayı veya sonsuz olabilir.*

Teorem 19 *A sonlu grubunda bulunan x elemanının basamađı, grubun basamađının bir bölenidir.*

Tanım 20 *(A, \circ) grubunun (B, \circ) bir altgrubu olsun. Eğer B nin A daki her sol yan kümesi aynı zamanda A da sağ yan küme oluyorsa (B, \circ) altgrubuna Normal Altgrup denir. Ohalde B nin A grubunun normal altgrubu olması için gerek ve yeter řart her $a \in A$ için*

$$a \circ B = B \circ a$$

olmasıdır.