

HEMIPTERA

Cimex lectularis (Tahta kurusu):

Bu tür larva döneminde ince, uzun ve açık sarı renklidir. Kısa, kalın ve basit tüyleri vardır. Ergin döneme geçtiğinde kan emdiği için vücut genişliği oval ve yassı bir yapıya dönüşür. Renk koyulaşır, kıllar daha az belirgin hale gelir. Bu nedenle enine çizgili bir yapı gösterir.

Rahatsız edildiklerinde nimf döneminde karın arkasında ve erginde thoraksın arkasında ya da son iki bacağı arasında bulunan koku bezlerinden kötü bir koku yayar. Evrimleri çevre sıcaklığı ve beslenmeye bağlıdır. Çevre sıcaklığı 13 derecenin altına düşerse, evrimlerini tamamlayamazlar.

Mekanik olarak kanla bulaşan bazı hastalıkları bulaştırdıkları bilinmektedir. Söktükleri yerde bazı kişilerde hiç belirti vermezken, bazılarında kırmızı, yuvarlak, sert kaşıntılı ödem ve iltihap görülür. Uyku düzeni bozulur ve vücutta kırmızı döküntüler oluşur.

Tedavisi yoktur. Barındıkları ortam ilaçlanarak korunma sağlanmış olur.

SIPHONAPTERA(PİRELER):

Ufak kanatsız, soluk sarıdan kahverengiye kadar deęişik renklerde olabilen bir parazittir. Memeli hayvanlardan ve kuşlardan kan emerek beslenen ektoparazit türlerdir. İnsanda **Puliosis** hastalığının etkenidir.

Pire sokması bazı insanlarda herhangi bir etki göstermez, özellikle alerjik insanlarda özel yaralar oluşur. Pireler daha çok vücudun kapalı yerlerini sokarlar. Soktukları yer önce nokta şeklindedir, sonra giderek kızarır.

Hastalıktan korunmak için eşyalar sık sık temizlenmeli ve insektisit kullanılmalıdır.