

Sabit / hareketli yer tutucular







Erken süt 2.azı çekimi

SINIF 2 OKLUZYON

YER DARLIĞI



- Erken çekim sonrası **molar mezializasyonu**.





- Erken çekim sonrası **alveoler kret** incelmesi.


- Erken çekim sonrası **molar tippingi**.



Genetik anomaliler



A,B



C

Phillip II –
Prince Ferdinand, 1575

Phillip IV, 1638

Charles IV ve ailesi, 1800

Hapsburg ailesi (Avusturya)

Karma dentisyon

Daimi diř tomurcukları, st diřlerinin lingualinde yer alır.




6 yař

(van der Linden FPGM, Deuterloo HS. Development of the Human Dentition: An Atlas. New York: Harper & Row; 1976.)

- ÜST KESERLER;

Süt keser kökünün palatinalinde labiale eğimli olarak bulunur.

- ✓ Travma ile daimi diş kökü oluşumu esnasında yön değiştirip kron-kök arası açılabilir, süremeyebilir ya da mine hipoplazisi görülebilir.
- ✓ Üst süt lateral kökünü rezorbe edebilir.



- ÜST LATERALLER;

Palatinalde yer alır.

Palatinalde sürebilir, kronu büyükse protrusiv sürebilir, süt kanin kökünü rezorbe edebilir.

