

# Bakteriyel Gıda İnfeksiyon ve İntoksikasyonları

# SALMONELLA

- 1888 yılında Alman arařtırıcı Gaertner tarafından et tüketimi sonucu řekillenen bir infeksiyon etkeni olarak bulunmuř ve *Bacterium enteritidis* (*Salmonella* Enteritidis)
- Amerikalı mikrobiyolog D.E. Salmon'un adına *Salmonella* olarak adlandırılmıřtır.
- *Salmonella* serotiplerinin sayısı 2600 dolayındadır

# SHIGELLA

- *Shigella* ilk kez Japon mikrobiyolog Kiyoshi Shiga tarafından 1898 yılında dizanteri etkeni olarak keşfedilmiştir.
- Dünyada görülen tüm dizanteri olgularının %30-50'sinin *Shigella*'dan kaynaklandığı ve shigellosis'ten yıllık yaklaşık 600 000 insanın öldüğü tahmin edilmektedir.

# *STAPHYLOCOCCUS AUREUS*

*Staphylococcus*, ilk kez 1884 yılında Micrococcaceae familyası içerisinde ayrı bir soy olarak tanımlanmıştır. Doğada yaygın olarak bulunur.

Stafilokokların temel kaynağını insan ve hayvanlar oluşturmaktadır

# *Listeria monocytogenes*

- *Listeria monocytogenes* ilk kez 1926 yılında Murray ve ark. tarafından laboratuvar tavşanlarında mononuklear leukositoza neden olan bir etken olarak *Bacterium monocytogenes* adıyla tanımlanmıştır. *Listeria* soyu ise adını İngiliz cerrah Joseph Lister'den almıştır.