



6 no. Sınıf I



6 no. Sınıf II

Postlaktal düzlem

V lerin distal kontakt noktaları

A) Distal basamak


-%56 K1 I %44 K1 II

B) Düz

-K1 II

C) Mesial basamak

• %70-80 K1 I – K1 III



- Süt dişlenme döneminde okluzyon genellikle başabaş ilişki gösterir (Sınıf II)



6 yaş dişlerinin Sınıf I e oturma mekanizması

- Postlaktal düzlemin mesial basamak göstermesi
- Mandibulanın maksillaya göre daha fazla anterior translasyonu (deplasmanı)
- **LEEWAY YER REZERVİ** mandibulada daha fazla yani alt süt V düştüğünde alt 6 no lar üste göre daha fazla mesiale yürümektedir

Daimi Dişlerin Sürmesi


- Üst Keserler - Protrusiv sürer - diş kavsi uzunluğu artar
- Alt Keserler – Süt dişlerle aynı konumda sürer – diş kavsi uzunluğu aynı kalır

- Üst Keserler - Protrusiv sürer - dış kavsi uzunluğu artar



Daimi diřler süt diřlerinden daha büyüktür

Santral+lateral ap toplamı=
ÜSTTE 8.2 mm ALTTA 5.6 mm fazladır



Daimi diřlere yer nasıl
bulunuyor ? ? ?

Daimi dişlere yer nasıl bulunuyor ? ? ?

- 1) Fizyolojik diastemaların kullanılması
- 2) **Maymun Diasteması=Üst 2.6 mm Alt 1.1 mm)**
- 3) **Diş kavsi uzunluğunun artması**
- 4) Üst keserler protrusiv sürer.
- 5) **Diş kavsi genişliğinin artması;**
Hem üst hem alt çenede kesiciler sürerken artar.

■ ALT SANTRALLER;

İlk süren daimi keserlerdir (6.5 yaşında)

Genelde problemsiz sürer.

Eğer süt santralin lingualinde sürmekteyse süt dişi hemen çekilir ve dil basıncı ile yerine gelmesi sağlanır.



- ALT LATERALLER;

Üst santrallerle aynı zamanda sürer (7_7.5 yaş).

Süt kaninleri vestibüle iter,böylece kaninlerarası genişlik artar ve maymun diastemaları kapanarak kendine yer sağlar.

Fizyolojik diastema yoksa ve mesiodistal çapı süt dişinden çok fazla ise lingualde sürebilir veya süt kanin kökünü rezorbe ederek erken kaybına yol açabilir.

Bu durumda daimi kaninin yerinden sürer ve onun sürmesini engeller.