

JEM 419 / JEM 459
MAGMATİK PETROGRAFI
DERSİ

2. HAFTA


Arş. Gör. Dr. Kıymet DENİZ

GENEL BİLGİLER

Petrografi Ve Petroloji Nedir?

- ❖ Latince **Petr-** taş kelimesinden türetilmiş **petrografi** ve **petroloji** birbirini tamamlayan ancak çalışma metotları ve amaçları bakımından birbirinden farklı iki bilim dalıdır.
- **Petrografi:** Kayaların tanımlamasını yapan bilim dalıdır. Bu tanımlamayı yaparken kayaçların minerolojik bileşimlerini, mikroskop altında gösterdikleri yapı ve doku özelliklerini, doğadaki bulunuş şekillerini inceler. Bu anlamda petrografi tanımsal bir bilim dalıdır.
- **Petroloji:** Kayaları oluşturan magmanın kökeninin ne olduğunu, oluşan magmanın yer yüzeyine doğru hareketi sırasında bileşiminin nasıl değiştiğini kimyasal analizler, modellemeler, ergitme-kristallenme deneyleri, sismik veriler vs. kullanarak açıklamaya çalışır. Kayaların hangi jeolojik ortamlarda ve hangi fiziko-kimyasal koşullar altında oluştuklarını inceler. Kayaların geçmişleri ile oluşumlarına etki eden kanunları ortaya koyar. Aynı bölgede bulunan çeşitli kaya türlerinin zaman ve mekân bakımından birbirleri ile olan ilişkilerini açıklayan bilim dalıdır. Bu bakımdan petroloji yorumsal bir bilim dalıdır. Petroloji içerdiği çalışma süreçleri bakımından petrografiden daha kapsamlıdır.
- **Petrojenez:** Petrolojinin bir dalı olup kayaçların kökenini ve oluşum tarzını inceler. Bu kapsamda kayaçların mineralojik, petrografik ve kimyasal özelliklerinden yararlanır. Petrojenez' in ana konusu kayaçların kimyasal özellikleridir.

MAGMA YERYUVARINDA HER YERDE OLUŞABİLİR Mİ?



YER YUVARININ YAPISI

Yer Yuvarınının Derinliklerine Ait Bilgiler Nasıl Elde Ediliyor?


- Derin kıtasal sondajlar
- Derin deniz sondajları
- Kıtaların üzerine bindirme yapmış okyanusal kabuk
- Manto ksenolitleri

Doğrudan

- Sismik hareketlerin incelenmesi
- Meteorlar
- Manto ergimesi sonucu oluşan birincil magmalardan oluşan volkanik kayalar
- Laboratuvarda gerçekleştirilen yüksek basınç ve sıcaklık deneyleri

Dolaylı

YERYUVARINI OLUŖTURAN KATMANLAR




	Ortalama Kalınlık (km)	Hacim 10^{27} cm^3	Ortalama Yoğunluk gr/cm^3	Kütle 10^{24} kg	Yüzde Kütle
<i>Atmosfer</i>				0.000005	0.00009
<i>Hidrosfer</i>	3.8	0.00137	1.03	0.00141	0.024
<i>Kabuk</i>	17	0.008	2.8	0.024	0.4
<i>Manto</i>	2883	0.899	4.5	4.016	67.2
<i>Çekirdek</i>	3471	0.175	11.0	1.936	32.4
<i>Tüm Dünya</i>	6371	1.083	5.52	5.976	100.00

	Kabuk	Manto	Çekirdek
O	47.25	43.70	
Si	30.54	22.5	
Al	7.38	1.60	
Fe	3.54	9.88	86.3
Ca	2.87	1.67	
K	2.82	0.11	
Na	2.45	0.84	
Mg	1.39	18.8	
Ti	0.47	0.08	
P	0.08	0.14	
Mn	0.07	0.33	
Ni	0.0044		7.36
Co	0.0012		0.40
S	0.031		5.94
Toplam	99.3466	99.65	100.00

YERKABUĐU

Kıtasal Kabuk – Okyanusal Kabuk



YERKABUĐU

Kıtasal Kabuk

Üst Kabuk-Alt Kabuk

Mineral	% Bolluk
<i>Plajiyoklas</i>	41
<i>Alkali Feld.</i>	21
<i>Kuvars</i>	21
<i>Amfibol</i>	6
<i>Ortopiroksen</i>	2
<i>Klinopiroksen</i>	2
<i>Olivin</i>	0.6
<i>Fe-Ti oksitler</i>	2
<i>Apatit</i>	0.5
<i>Diđerleri (kalsit, kil vs.)</i>	3.9
<i>Toplam</i>	100

Üst KabuĐun mineralojik bileřimi

YERKABUĞU

Kıtasal Kabuk

Üst Kabuk-Alt Kabuk

Kor Kayaçlar		Tortul Kayaçlar	
<i>Granit, Granodiyorit</i>	77	<i>Şeyl</i>	72
<i>Kuvars diyorit</i>	8	<i>Karbonatlı kayaçlar</i>	15
<i>Diyorit</i>	1	<i>Kumtaşları</i>	11
<i>Gabro</i>	13	<i>Evaporitler</i>	2
<i>Siyenit, anortozit, peridotit</i>	1		

Üst Kıtasal kabuktaki magmatik ve tortul kayaların bollukları (White 1999'dan alınmıştır)

YERKABUĐU

Kıtasal Kabuk

Üst Kabuk-Alt Kabuk

Kor Kayaçlar		Tortul Kayaçlar	
<i>Granit, Granodiyorit</i>	77	<i>Şeyl</i>	72
<i>Kuvars diyorit</i>	8	<i>Karbonatlı kayaçlar</i>	15
<i>Diyorit</i>	1	<i>Kumtaşları</i>	11
<i>Gabro</i>	13	<i>Evaporitler</i>	2
<i>Siyenit, anortozit, peridotit</i>	1		

Üst Kıtasal kabuktaki magmatik ve tortul kayaların bollukları (White 1999'dan alınmıştır)

YERKABUĐU


Kıtasal Kabuk

Alt Kabuk

Alt kıtasal kabuĐun bileřiminin amfibolit, gnays gibi hidroksil iyonu iĐeren minerallerin bulunduĐu kayalardan yada granülit ve eklojitler gibi yapılarında sulu mineral bulunmayan kayalardan oluřtuĐu düřünülmektedir.

YERKABUĞU

Okyanusal Kabuk



YERKABUĐU

Manto

Yeryuvarının kabuk kesiminden çekirdeğine kadar devam eden bölümü olup, üst ve alt manto olarak iki bölüme ayrılır. Üst manto, Moho süreksizliğinden başlayarak, 670 km derine kadar devam eder. Litosferin alt kısmını (litosferik manto) ve astenosferi kapsar.

Litosfer: Yeryuvarını saran en dış kabuktur ve hareketli okyanusal ve kıtasal levhalardan oluşur. Litosferin tabanı S dalgalarının hızlarında çok ani bir düşüşün olması ile karakteristiktir. Bu zon, özellikle okyanus kabuğu altında sıcaklığın yaklaşık 1200 °C olduğu bir bölgedir

Astenosfer: Litosferin tabanından başlayarak yaklaşık 250 km derine kadar devam eden düşük hız zonudur. Bu zonda bütün sismik dalgalar zayıflar. Bu da astenosferin kısmen ergimiş madde (~ % 1) içerdiğinin bir göstergesidir.

Kabuğun altında Moho süreksizliğinin %83'ünü oluşturan manto kıtaların hareketi, okyanus açılımı, dağ oluşumu (orojenez) ve deprem gibi jeolojik olayların nedeni plaka dinamiğinin oluşmasını sağlayan kaynak bölgedir. Mantonun okyanus tabanının bazı bölgelerinde 5 km kadar sığıklara sokulmasına rağmen günümüzde mantoya sondajlarla ulaşılamamıştır. Üst mantoya ulaşılamamış olmasına rağmen jeofizik ve jeolojik kanıtlarla kimyasal bileşiminin MgO ve SiO₂ olan peridotit olduğu düşünülmektedir.


YERKABUĐU

Çekirdek



Yerkürenin ulaşılması imkânsız olan kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle çekirdeğin yapısı ve mineralojik bileşimi jeofizik modellemeler ve yeryüzüne düşmüş Fe ve Ni bileşimli meteoritlerden elde edilen verilerden benzetmeler yapılarak belirlenmiştir. Demirli ve nikelli meteoritlerin varlığından dolayı çekirdeğin %6 Ni ve %94 Fe bileşimli olabileceği başlangıçta düşünülen bir modeldir. Ancak daha sonra çekirdeği oluşturabilecek materyallerin yüksek basınçtaki yeniden şekillenmiş silikat bileşenleri olabileceği varsayılmıştır. Ancak günümüzdeki deneysel çalışmalar yaklaşık 2400 kbar basınç altında (4000 km derinliğe karşılık gelmektedir) silikatların atom yapılarının bozularak yoğun metallere dönüştükleri ortaya çıkarmıştır.

Sismik S dalgaları sıvı ortamlarda yayılamamaktadır. Bu nedenle S dalgaları mantodan daha derinlere (2900 km) geçemez. Kısaca 2900 km derinlikte bulunan bu geçiş zonunda, (manto-dış çekirdek zonu) dış çekirdek eriyik bir halde olmalıdır. Yoğunluk değeri dış çekirdekte 10 g/cm^3 den iç çekirdekte 13.6 g/cm^3 e kadar değişir. Bu yoğunluk değerleri, yaklaşık %6 oranında Ni içeren Fe-Ni alaşımından yaklaşık %10 daha azdır. Bu alaşımda ses dalgalarının hızı jeofiziksel verilere göre daha düşüktür. Yani çekirdeğin bileşiminde hafif elementler de olmalıdır. Si ve/veya S özellikle kükürt, Fe ve Ni ile alaşım yapabilecek ve alaşımın yoğunluğunu çekirdek için bilinen değerlere ($10 - 13.6 \text{ g/cm}^3$) indirebilecek bir elementtir. Özetle çekirdek, Fe, Ni ve bir miktar S içeren bir kimyasal bileşime sahiptir.

KAYAÇ DÖNGÜSÜ



Kayaç Türlerinin Yerkabuğundaki Dağılımları



	Belirlenen	Hesaplanan
Kiltaş-Şeyl	% 47	% 77
Kumtaş	% 31	% 14
Kireçtaş	% 22	% 9