

SKY 203  
BİYOİSTATİSTİK  
DERS NOTLARI  
10.HAFTA

DR. İNCİ AÇIKGÖZ

# NORMAL DAĞILIM

Ölçümle elde edilen verilerin oluşturduğu sürekli bir dağılımdır.  
 $i=0,1,\dots,n$  olmak üzere

$X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$  biçiminde gösterilir.

Olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$-\infty < x < +\infty$$

$$-\infty < \mu < +\infty$$

$$\sigma^2 > 0$$

dır.

Burada,

$\mu$  : evren ortalaması

$\sigma$  : evren standart sapması olmak üzere,

$$\pi = 3.14$$

$$e = 2.71$$

dir.

Normal dağılım,

- ortalamaya göre simetrik bir dağılımdır.
- Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri birbirine eşittir.
- Eğri altında kalan alan 1'e eşittir

- $\mu \mp \sigma$  arasındaki alan toplam alanın %68.26'sını,  $\mu \mp 2\sigma$  arasındaki alan toplam alanın %95.44'ünü,  $\mu \mp 3\sigma$  arasındaki alan toplam alanın %99.74'ünü ve  $\mu \mp 4\sigma$  arasındaki alan toplam alanın %100'ünü verir.

## Standart Normal Dağılım:

Ortalaması sıfır (0) ve varyansı 1 olan dağılımdır.  $z$  ile gösterilir. Normal dağılımın

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

formülü kullanılarak standart normal dağılıma dönüşümü yapılır.

ÖR:

$$P(0 \leq z \leq 1) = ?$$

$$= 0.8413 - 0.5$$

$$= 0.3413$$